

Bijsluiter: Informatie voor de patiënt

Streptuss weegbree siroop, stroop

Smalle weegbree blad droog extract

(Plantaginis lanceolatae folii extractum siccum)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met u arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Streptuss weegbree siroop en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Streptuss weegbree siroop is en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Streptuss weegbree siroop is een traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt gebruikt als verzachtend middel voor de symptomatische behandeling van een geïrriteerde mond of keel en daarmee samenhangende droge hoest. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Streptuss weegbree siroop wordt aanbevolen bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 3 jaar.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw symptomen verergeren, als u last krijgt van kortademigheid, koorts of etterend slijm (geelachtig slijm) tijdens het gebruik van het medicijn.

Gebruik bij patiënten met een verminderde nier- en/of leverfunctie

Als u lijdt aan een verminderde nier- en/of leverfunctie, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Streptuss weegbree siroop gebruikt. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor doseringsaanbevelingen bij deze patiënten.

Kinderen

Het gebruik van Streptuss weegbree siroop bij kinderen jonger dan 3 jaar wordt niet aanbevolen vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Streptuss weegbree siroop nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere medicijnen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn echter geen medicijn linteracties gemeld.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

De veiligheid tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Bij gebrek aan voldoende gegevens wordt het gebruik tijdens de zwangerschap niet aanbevolen.

Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof of de metabolieten ervan in de moedermelk worden uitgescheiden. Een risico voor de pasgeborene/zuigeling die borstvoeding krijgt, kan niet worden uitgesloten. Streptuss weegbree siroop mag daarom niet worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht naar het effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Streptuss weegbree siroop bevat maltitolvloeistof (bevat maltitol en sorbitol)

Dit medicijn bevat maximaal 225 mg sorbitol in 5 ml (in vloeibare maltitol).

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Streptuss weegbree siroop bevat ethanol (alcohol)

Dit medicijn bevat 78,5 mg alcohol (ethanol) per doseringseenheid overeenkomend met 7,85 mg/ml (0,785 % (w/v)). De hoeveelheid per 10 ml in dit medicijn komt overeen met minder dan 2 ml bier of 1 ml wijn.

Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit medicijn. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:

10 ml siroop 3 tot 4 keer per dag.

Kinderen van 5 tot 11 jaar:

10 ml siroop drie keer per dag.

Kinderen van 3 tot 4 jaar:

5 ml siroop drie keer per dag.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik van Streptuss weegbree siroop bij kinderen jonger dan 3 jaar wordt niet aanbevolen vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.

Wijze van toediening

Oraal gebruik.

Gebruik voor de juiste dosering de bijgevoegde maatlepel en breng de geschikte maatstrepen 2,5 en 5 ml aan.

Schud de fles voor gebruik.

Duur van het gebruik

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met u arts.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Er zijn geen gevallen van overdosering gemeld.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Geen bekend.

Als er bijwerkingen optreden, moet een arts worden geraadpleegd.

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook melden via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Tijdens de opslag kan er bezinksel ontstaan. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het product. U kunt het product veilig blijven gebruiken, Beneden 25°C bewaren na eerste opening.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de fles na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit medicijn mag niet langer dan 3 maanden na de eerste opening van de fles worden gebruikt. Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- Het actief bestanddeel van dit medicijn is smalle weegbree blad droog extract. Elke ml (overeenkomend met 1,2 g) stroop bevat 30 mg extract (als droog extract) van *Plantago lanceolata* L.s.l., folium (Smalle weegbree blad) overeenkomend met 90 to 150 mg Smalle weegbree blad.
Extractiemiddel: ethanol 20% (m/m).
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: maltodextrine, vloeibare maltitol (E965), sorbitol (E421)xanthaangom (E415), kaliumsorbaat (E202), citroenzuur (E330), natuurlijke honing-citroen-verbena smaak (smaak bevat ethanol), gezuiverd water.

Hoe ziet Streptuss weegbree siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De stroop is een bruine vloeistof met karakteristieke geur, verpakt in flessen met een inhoud van 100 of 200 ml. De flesjes worden verder verpakt in vouwdozen met een bijsluiters en een maatlepel.

Verpakkingsgrootte 100 ml en 200 ml: Op de maatlepel staan twee verschillende schalen, waaronder de schaalverdeling van 2,5 en 5 ml.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Reckitt Benckiser Healthcare B.V.
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp
Nederland

Fabrikant

Phytopharm Klęka S.A
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polen

Dit medicijn is geregistreerd in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Oostenrijk	StrepHustan Spitzwegerich Hustenreizlinder 30 mg/ml Sirup
Estland	Septils 30 mg/ml siirup
Letland	Septils 30 mg/ml sīrups
Litouwen	Septils 30 mg/ml sirupas
België	Streptuss weegbree siroop Streptuss plantain sirop Streptuss Wegerich Sirup
Bulgarije	StrepTuss Active Naturals Plantain 30 mg/ml, syrup / СтрeпТус Актив Нечъралс Живовляк 30 mg/ml сироп
Kroatië	Streptusan sirup
Tsjechië	Strevox 30 mg/ml sirup
Denemarken	StrepHost Tør 30 mg/ml sirup
Finland	Streptus Dry 30 mg/ml siirappi
Frankrijk	STREPSILS TOUX SECHE PLANTAIN 30 mg/ml, sirop
Duitsland	Dobendan Hustenstilller 30 mg/ml Sirup
Griekenland	StrepCough Plantain 30 mg/ml σιρόπι
Hongarije	Streptuss 30 mg/ml szirup
IJsland	StrepHost Tør 30 mg/ml síróp
Ierland	tbd
Italië	Benactuss Tosse Secca E Emolliente Gola mg/ml sciroppo
Nederland	Streptuss weegbree siroop
Noorwegen	Streplieve 30 mg/ml sirup
Polen	Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło 30 mg/ml syrop
Portugal	Streptosse Active Naturals Tosse Seca xarope
Roemenië	StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop
Slovakije	Strevox 30 mg/ml sirup
Slovenië	Streptusan 30 mg/ml sirup
Spanje	Streptos llantén 30 mg/ml jarabe
Zweden	Streplieve 30 mg/ml sirap

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2024.