

## **Bijsluiter: informatie voor de patiënt**

### **Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten** **Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten**

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat zijn Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat zijn **Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten** en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten bevatten amylmetacresol en 2,4-dichloorbenzylalcohol. Deze bestanddelen hebben beide een licht ontsmettende (desinfecterende) werking.

Dit medicijn wordt gebruikt om verschijnselen van keelpijn te verlichten. Door op de zuigtablet te zuigen kunnen de werkzame bestanddelen inwerken op het gebied dat ongemak geeft en het pijnlijke gebied ook smeren en verzachten. Dit helpt om de pijn en het ongemak in de mond en keel te verlichten.

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

Dit product wordt aanbevolen voor volwassenen, kinderen (ouder dan 6 jaar) en ouderen.

#### **Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?**

U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?**

Neem contact op met uw arts of apotheker als u last heeft van andere keelproblemen.

Langdurig gebruik van dit medicijn wordt niet aanbevolen.

Over het algemeen is keelpijn een lichte ziekte die niet langer dan een week duurt. Neem contact op met uw arts als de klachten langer dan 3 dagen duren, erger worden of als u andere klachten krijgt, zoals hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid of overgeven, en huiduitslag. Dit kan een bacteriële infectie zijn (keelontsteking, amandelontsteking). Een bacteriële infectie moet op een andere manier worden behandeld.

### **Kinderen**

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten mogen niet aan kinderen jonger dan 6 jaar worden gegeven.

Vanwege de grootte van de zuigtabletten kunnen jonge kinderen stikken in Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten.

### **Gebruikt u nog andere medicijnen?**

Gebruikt u naast Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Voor zover bekend kan dit medicijn in combinatie met andere medicijnen worden gebruikt.

### **Patiënten met een nier- en/of leverfunctiestoornis**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten bij patiënten bij wie de nieren en/of lever niet goed werken.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap:

De veiligheid van dit medicijn bij een zwangerschap is niet vastgesteld. Daarom wordt het gebruik van dit medicijn niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding:

Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Daarom wordt het gebruik van dit medicijn niet aanbevolen in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Vruchtbaarheid:

Er zijn geen gegevens over het effect van gebruik van amylmetacresol en 2,4-dichloorbenzylalcohol op de vruchtbaarheid.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten hebben nauwelijks of geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

**Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten bevatten:** essentiële pepermuntolie, chinolinegeel, natriumsacharine, tartaarzuur, zonnegeel, citroenextract, honingsmaakstof, isomalt, maltitol.

Dit product bevat zonnegeel. Deze hulpstof kan allergische reacties veroorzaken.

**Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten bevatten:** essentiële pepermuntolie, essentiële steranijsolie, levomenthol, indigokarmijnkleurstof, chinolinegeel, natriumsacharine, tartaarzuur, isomalt, maltitol.

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg zuigtabletten bevatten maltitol en isomalt. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

### **3. Hoe gebruikt u dit medicijn?**

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het gebruik van dit medicijn voor langer dan 3 dagen wordt niet aanbevolen.

#### **Gebruik bij volwassenen:**

1 zuigtablet om de 2 of 3 uur, naar behoefte, tot maximaal 8 zuigtabletten per 24 uur.

#### **Gebruik bij kinderen ouder dan 6 jaar:**

Maximaal 4 zuigtabletten per 24 uur, met ten minste 2 uur tussen de zuigtabletten.

Laat dit medicijn langzaam oplossen in de mond. Slik dit medicijn niet door, kauw of bijt er niet op.

#### **Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?**

Heeft u meer dan de aanbevolen dosering ingenomen? Dan kunt u last krijgen van uw maag en darmen. Neem dit product niet verder in en neem contact op met uw arts of apotheker.

#### **Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?**

- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Ga verder met het normale gebruik van dit product.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Wordt een bijwerking ernstig? Of merkt u bijwerkingen op die niet in deze bijsluiter staan? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)  
overgevoeligheidsreacties, waaronder huiduitslag, brandend gevoel, jeuk en zwelling van de mond of keel.

De frequentie van de volgende bijwerkingen is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): huiduitslag met jeuk, snelle zwelling onder de huid, moeite met ademen, brandend of tintelend gevoel in of rond de mond, en klachten van de maag en darmen zoals het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed (indigestie) en misselijk zijn.

## Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in [aanhangsel V](#).

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## 5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stoffen in dit medicijn zijn amylmetacresol en 2,4-dichloorbenzylalcohol.

Elke zuigtablet bevat 0,6 mg amylmetacresol en 1,2 mg 2,4-dichloorbenzylalcohol.

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten:

De andere stoffen in dit medicijn zijn:

Essentiële pepermintolie  
Chinolinegeel (E-104)  
Natriumsacharine (E-954)  
Tartaarzuur (E-334)  
Zonnegeel (E-110)  
Citroenextract  
Honingsmaakstof  
Isomalt (E-953)  
Maltitol (E-965)

Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten:

De andere stoffen in dit medicijn zijn:

Essentiële pepermintolie  
Essentiële steranijsolie  
Levomenthol  
Indigokarmijnkleurstof (E-132)  
Chinolinegeel (E-104)  
Natriumsacharine (E-954)  
Tartaarzuur (E-334)  
Isomalt (E-953)  
Maltitol (E-965)

**Hoe zien Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten/Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten eruit en wat zit er in een verpakking?**

Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48 zuigtabletten.  
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

tetesept Pharma GmbH  
Marschnerstrasse 10  
60318 Frankfurt Am Main  
Duitsland

Fabrikant:

Lozy's Pharmaceuticals S.L.  
Campus Empresarial s/n  
31795 Lekaroz (Navarra)  
Spanje

### **In het register ingeschreven onder**

*Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg honing-citroen, zuigtabletten:*  
RVG 131315

*Amylmetacresol - dichloorbenzylalcohol tetesept 0,6/1,2 mg mint, zuigtabletten:*  
RVG 131317

### **Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:**

**Duitsland:** Anginosan 1,2 mg/0,6 mg Lutschtabletten mit Honig-Zitronengeschmack/ Anginosan 1,2 mg/0,6 mg Lutschtabletten mit Minzengeschmack

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

#### **Duitsland**

tetesept Pharma GmbH  
Marschnerstrasse 10  
D-60318 Frankfurt Am Main  
Duitsland  
Telefoon: 069/1503-1  
E-mail: [Kundenservice.portal@merz.de](mailto:Kundenservice.portal@merz.de)

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2024**