

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT****Carbomeer Medcor 2 mg/g ooggel**

carbomeer

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Carbomeer Medcor en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAT IS CARBOMEER MEDCOR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?**

Carbomeer Medcor is een steriele ooggel voor oogheelkundig gebruik. Carbomeer Medcor heeft bevochtigende eigenschappen en wordt door uw arts voorgeschreven om verschijnselen van de droge ogen te behandelen:

- bij verminderde traanproductie
- bij het syndroom van Sjögren (ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken)
- wanneer het oog niet gesloten kan worden door beschadiging van de oogleden of door zenuwverlammingen

**2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?****Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- wanneer u contactlenzen draagt. Overleg vóór gebruik met de arts of u contactlenzen mag dragen tijdens de behandeling met Carbomeer Medcor. Zachte contactlenzen moeten vóór het indruppelen worden verwijderd en mogen pas na ongeveer 15 minuten weer in het oog worden aangebracht. Harde contactlenzen hoeven niet te worden verwijderd.
- wanneer de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert. In dat geval moet het gebruik van Carbomeer Medcor worden gestopt en moet contact worden opgenomen met de arts.

Neem contact op met uw arts of apotheker of voordat u dit middel gebruikt.

**Kinderen en adolescenten tot 18 jaar**

De veiligheid en werkzaamheid van Carbomeer Medcor bij kinderen en adolescenten in de dosering aanbevolen bij volwassenen is vastgesteld op basis van klinische ervaring. Er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Als u ook andere oogdruppels gebruikt, is het aan te raden om na het indruppelen van de andere druppels 15 minuten te wachten met het aanbrengen van Carbomeer Medcor.

Gebruikt u naast Carbomeer Medcor nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

**Zwangerschap en borstvoeding**

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Na inbrengen van de ooggel kan wazig zien vóórkomen waardoor het gezichtsvermogen gedurende korte tijd verminderd is. Als u last heeft van wazig zien, bestuur dan geen voertuigen.

**3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Breng 1 druppel in het te behandelen oog aan al naar gelang de behoefte:

- Leun met het hoofd achterover en kijk naar het plafond.
- Plaats een vinger op de wang juist onder het te behandelen oog en trek het ooglid voorzichtig omlaag totdat een 'V'-vormig zakje ontstaat tussen de oogbol en het onderste ooglid.
- Laat een druppel in dit zakje vallen door licht te drukken op de tube. Let erop dat de punt van de tube niet in aanraking komt met het oog en de oogleden, omdat anders besmetting van de tube kan optreden. Sluit de tube na het indruppelen goed af. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Carbomeer Medcor moet gebruiken. In geval u bemerkt dat Carbomeer Medcor te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

**Kinderen en adolescenten tot 18 jaar**

De veiligheid en werkzaamheid van Carbomeer Medcor bij kinderen en adolescenten in de dosering aanbevolen bij volwassenen is vastgesteld op basis van klinische ervaring. Er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

**Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Er zijn geen nadelige effecten bekend na toediening van teveel Carbomeer Medcor.

Als u teveel druppels Carbomeer Medcor heeft gebruikt en er treden toch bijwerkingen op, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

**Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

**Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Uw klachten kunnen terugkeren of verergeren. Onderbreek nooit het gebruik ervan zonder overleg met arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

**Oogaandoeningen**

- Soms (bij meer dan 1 op de 1.000 personen maar bij minder dan 1 op de 100): wazig zien, branderigheid. Bovenstaande bijwerkingen zijn milde bijwerkingen van Carbomeer Medcor, die meestal na korte tijd vanzelf verdwijnen.
- Zeer zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 personen maar bij minder dan 1 op de 1.000): lokale overgevoeligheidsreacties.

**Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

**5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Na opening niet langer dan 6 weken gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

**6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE****Welke stoffen zitten er in dit middel?**

De werkzame stof in dit middel is carbomeer. 1 g ooggel bevat 2 mg carbomeer. De andere stoffen in dit middel zijn cetrimide, natriumhydroxide (voor pH-aanpassing), sorbitol en water voor injectie.

**Hoe ziet Carbomeer Medcor er uit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Carbomeer Medcor ooggel is een heldere kleurloze gel. Het is verpakt in een doos met 3 tubes met een inhoud van 10 gram.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Vergunninghouder/ompakker:

Medcor Pharmaceuticals B.V., Artemisweg 232, 8239 DE Lelystad

Fabrikant:

Dr. Gerhard Mann, Chem-Pharm Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlijn, Duitsland

**In het register ingeschreven onder:**

Carbomeer Medcor 2 mg/g ooggel  
RVG 132542/14862 L.v.h.: Duitsland

Het product uit deze bijsluiter wordt in het land van herkomst op de markt gebracht onder de naam Visc-Ophtal.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2023.**