

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-1

### Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

#### Dimethylfumaraat CF 120 mg, harde maagsapresistente capsules Dimethylfumaraat CF 240 mg, harde maagsapresistente capsules

dimethylfumaraat

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Dimethylfumaraat CF en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Dimethylfumaraat CF en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

##### **Wat is Dimethylfumaraat CF?**

Dimethylfumaraat CF is een medicijn dat de werkzame stof dimethylfumaraat bevat.

##### **Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?**

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van relapsing-remitting multipale sclerose (MS) bij patiënten van 13 jaar en ouder.

MS is een langdurige aandoening die het centrale zenuwstelsel (CZS) aantast, waaronder de hersenen en het ruggenmerg. Relapsing-remitting MS wordt gekenmerkt door herhaalde aanvallen (relapses) van zenuwstelselsymptomen. De symptomen verschillen van patiënt tot patiënt, maar bestaan meestal uit loopproblemen, zich onvast op de benen voelen en problemen met zien (bijv. wazig of dubbel zien). Deze symptomen kunnen volledig verdwijnen wanneer de relaps achter de rug is maar sommige problemen kunnen voortduren.

##### **Hoe werkt dit medicijn?**

Dit medicijn lijkt ervoor te zorgen dat het afweersysteem van uw lichaam uw hersenen en ruggenmerg niet meer beschadigt. Dit kan wellicht ook helpen om de verslechtering van uw MS in de toekomst te vertragen.

#### **2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-2

### Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- **U bent allergisch voor** een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- **Als er een vermoeden bestaat dat u aan een zeldzame herseninfectie lijdt met de naam progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) of als PML bevestigd is.**

### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Dit medicijn kan uw **aantal witte bloedcellen**, uw **nieren** en uw **lever** aantasten. Voordat u dit medicijn gaat innemen, zal uw arts een bloedonderzoek doen om het aantal witte bloedcellen te meten en zal uw arts nagaan of uw nieren en lever goed functioneren. Uw arts zal deze onderzoeken tijdens de behandeling van tijd tot tijd uitvoeren. Als uw aantal witte bloedcellen tijdens de behandeling afneemt, kan uw arts aanvullend onderzoek overwegen of de behandeling stoppen.

**Praat met uw arts** voordat u dit medicijn inneemt als u last heeft van:

- een ernstige **nieraandoening**
- een ernstige **leveraandoening**
- een aandoening van de **maag** of **darm**
- een ernstige **infectie** (zoals longontsteking)

Gordelroos (*herpes zoster*) kan voorkomen bij behandeling met dit medicijn. In sommige gevallen hebben zich ernstige complicaties voorgedaan. **Neem onmiddellijk contact op met uw arts** als u vermoedt dat u verschijnselen van gordelroos heeft.

Als u denkt dat uw MS verergert (bijvoorbeeld zwakte of veranderingen in uw gezichtsvermogen) of als u nieuwe verschijnselen opmerkt, praat dan onmiddellijk met uw arts omdat dit verschijnselen kunnen zijn van een zeldzame herseninfectie met de naam progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). PML is een ernstige aandoening die kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden.

Er is een zeldzame maar ernstige nieraandoening (*het syndroom van Fanconi*) gemeld voor een medicijn dat dimethylfumaraat bevat, in combinatie met andere fumaarzuuresters, die zijn gebruikt om psoriasis (een ziekte van de huid) te behandelen. Als u merkt dat u meer plast, meer dorst heeft en meer drinkt dan normaal, uw spieren zwakker lijken, u een bot breekt of u simpelweg pijn heeft, overleg dan zo snel mogelijk met uw arts zodat dit verder onderzocht kan worden.

### Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De waarschuwingen en voorzorgen die hierboven worden vermeld, gelden ook voor kinderen. Dit medicijn kan worden gebruikt bij kinderen en jongeren van 13 jaar en ouder. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor kinderen jonger dan 10 jaar.

### Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Dimethylfumaraat CF nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? **Vertel dat dan uw arts of apotheker**, met name als u de volgende medicijnen gebruikt:

- medicijnen die **fumaarzuuresters** (fumaraten) bevatten om psoriasis te behandelen
- **medicijnen die inwerken op het immuunsysteem van het lichaam**, waaronder **andere medicijnen die worden gebruikt om MS te behandelen**, zoals fingolimod, natalizumab, teriflunomide, alemtuzumab, ocrelizumab of cladribine of een aantal vaak gebruikte **kanker**behandelingen (rituximab of mitoxantrone)

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-3

- **medicijnen die inwerken op de nieren, waaronder** een aantal **antibiotica** (gebruikt om infecties te behandelen), “**plastabletten**” (diuretica), **bepaalde soorten pijnstillers** (zoals ibuprofen en andere soortgelijke ontstekingsremmers en medicijnen die zonder voorschrift van de arts zijn gekocht) en medicijnen die **lithium** bevatten
- het gebruik van Dimethylfumaraat CF met bepaalde **vaccintypes** (levende vaccins) kan ertoe leiden dat u een infectie krijgt en moet, daarom, worden vermeden. Uw arts zal u adviseren of andere vaccintypes (niet-levende vaccins) kunnen worden toegediend.

### Waarop moet u letten met alcohol?

Consumptie van meer dan een geringe hoeveelheid (meer dan 50 ml) sterk-alcoholische dranken (meer dan 30% alcoholvolume) moet worden vermeden binnen een uur na het innemen van dit medicijn, omdat alcohol een wisselwerking kan hebben met dit medicijn. Dit kan ontsteking van de maag (gastritis) veroorzaken, vooral bij mensen die al gevoelig zijn voor gastritis.

### Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

#### Zwangerschap

Gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent, tenzij u dit met uw arts heeft besproken.

#### Borstvoeding

Het is niet bekend of de werkzame stof van dit medicijn in de moedermelk wordt uitgescheiden. Dit medicijn mag niet worden gebruikt tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Uw arts zal u helpen beslissen of u moet stoppen met borstvoeding of moet stoppen met dit medicijn. Dit betekent dat het voordeel van borstvoeding voor uw kind en het voordeel van de behandeling voor uzelf moet worden afgewogen.

### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het effect van dit medicijn op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken is niet bekend. Dit medicijn heeft naar verwachting geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

## 3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### Startdosering

#### **120 mg tweemaal per dag.**

Neem deze startdosering de eerste 7 dagen in en neem daarna de gebruikelijke dosering in.

### Gebruikelijke dosering

#### **240 mg tweemaal per dag.**

Dit medicijn is bestemd voor oraal gebruik.

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-4

**Slik elke capsule heel in** met wat water. U mag de capsule niet breken, fijnmaken of oplossen en u mag er niet op zuigen of kauwen, omdat dit een aantal bijwerkingen kan verergeren.

**Neem dit medicijn met voedsel in** – dit kan helpen om een aantal van de zeer vaak voorkomende bijwerkingen (vermeld in rubriek 4) te verminderen.

#### **Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?**

Als u te veel capsules heeft ingenomen, **neem dan onmiddellijk contact op met uw arts**. Het is mogelijk dat u bijwerkingen ondervindt die lijken op de bijwerkingen die zijn beschreven in rubriek 4 hieronder.

#### **Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?**

**Neem geen dubbele dosis** om een vergeten dosis in te halen.

U mag de vergeten dosis innemen als u minstens 4 uur tussen de doses in laat. Anders moet u wachten tot uw volgende geplande dosis.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

### **Ernstige bijwerkingen**

Dit medicijn kan het aantal lymfocyten (een soort witte bloedcel) verlagen. Als u een verminderd aantal witte bloedcellen heeft, kunt u een grotere kans op infectie hebben, waaronder het risico op een zeldzame herseninfectie genaamd progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). PML kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden. Gevallen van PML kwamen voor na 1 tot 5 jaar behandeling. Daarom moet uw arts uw witte bloedcellen blijven controleren tijdens uw behandeling en moet u letten op mogelijke verschijnselen van PML, zoals hieronder beschreven. Het risico op PML kan hoger zijn als u eerder een medicijn heeft gebruikt dat de werking van het afweersysteem van uw lichaam vermindert.

De symptomen van PML kunnen op die van een MS-relaps lijken. Verschijnselen kunnen omvatten: nieuwe of verergerende zwakte aan één zijde van het lichaam, veranderingen in uw gezichtsvermogen, denkvermogen of geheugen, verwardheid of veranderingen in persoonlijkheid of problemen met spraak en communiceren die langer dan een paar dagen duren. Daarom is het zeer belangrijk dat u, als u denkt dat uw MS verslechtert of als u nieuwe verschijnselen opvallen gedurende de behandeling met dit medicijn, zo snel mogelijk contact opneemt met uw arts. Overleg ook met uw partner of zorgverleners en informeer hen over uw behandeling. Er kunnen verschijnselen optreden waar u zich niet zelf van bewust bent.

**Bel onmiddellijk uw arts als u een of meer van deze symptomen krijgt**

### **Ernstige allergische reacties**

De frequentie van ernstige allergische reacties kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald (niet bekend).

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-5

Rood worden van het gezicht of lichaam (*flushing*) is een zeer vaak voorkomende bijwerking. Als rood worden echter gepaard gaat met een rode huiduitslag of netelroos (galbulten) **en** u daarbij ook nog een van de volgende symptomen krijgt:

- opzwellen van het gezicht, de lippen, mond of tong (*angio-oedeem*)
- fluitende ademhaling, moeite met ademen of kortademigheid (*dyspneu, hypoxie*)
- duizeligheid of bewustzijnsverlies (*hypotensie*)

kan het om een ernstige allergische reactie (*anafylaxie*) gaan.

**Stop met het gebruik van dit medicijn en u bel onmiddellijk uw arts**

### **Zeer vaak voorkomende bijwerkingen**

Komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers:

- rood worden van het gezicht of een warm, heet, brandend gevoel of jeuk van het lichaam (*flushing*)
- stoelgang met dunne ontlasting (*diarree*)
- misselijkheid
- maagpijn of maagkrampen

**Het met voedsel innemen van uw medicijn kan helpen om bovenstaande bijwerkingen te verminderen.**

Stoffen die ketonen worden genoemd, die van nature in het lichaam worden aangemaakt, worden zeer vaak aangetroffen in urineonderzoek tijdens het gebruik van dit medicijn.

Praat met uw arts over manieren om met deze bijwerkingen om te gaan. Uw arts kan uw dosis verlagen. Verlaag uw dosis echter alleen als uw arts u dat heeft gezegd.

### **Vaak voorkomende bijwerkingen**

Komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers:

- ontsteking van de bekleding van de darmen (*gastro-enteritis*)
- braken
- indigestie (*dyspepsie*)
- ontsteking van de bekleding van de maag (*gastritis*)
- maagdarmaandoening
- brandend gevoel
- opvlieger, zich warm voelen
- jeukende huid (*pruritus*)
- huiduitslag
- roze of rode vlekken op de huid (*erytheem*)
- haaruitval (*alopecia*)

### **Bijwerkingen die in bloed- of urineonderzoeken te zien kunnen zijn**

- laag aantal witte bloedcellen (*lymfopenie, leukopenie*) in het bloed. Een vermindering van het aantal witte bloedcellen kan betekenen dat uw lichaam minder goed in staat is om een infectie te bestrijden. Als u een ernstige infectie heeft (zoals longontsteking), moet u dit onmiddellijk met uw arts bespreken
- proteïnen (*albumine*) in de urine
- toename van het aantal leverenzymen (*ALAT, ASAT*) in het bloed

### **Soms voorkomende bijwerkingen**

Komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers:

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-6

- allergische reacties (overgevoeligheid)
- daling van het aantal bloedplaatjes

**Niet bekend** (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- leverontsteking en stijging in leverenzymgehalten (ALAT of ASAT in combinatie met bilirubine)
- gordelroos (herpes zoster) met verschijnselen zoals blaasjes, een brandende, jeukende of pijnlijke huid, meestal aan één kant van het bovenlichaam of het gezicht, en andere verschijnselen zoals koorts en zwakte in de vroege fases van infectie, gevolgd door gevoelloosheid, jeuk of rode vlekken met ernstige pijn
- loopneus (rhinorroe)

### **Kinderen (13 jaar en ouder) en jongeren tot 18 jaar**

De bijwerkingen die hierboven worden vermeld, gelden ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Sommige bijwerkingen werden vaker gemeld bij kinderen en jongeren tot 18 jaar dan bij volwassenen, bijv. hoofdpijn, buikpijn of maagkrampen, braken, keelpijn, hoesten en pijnlijke menstruaties.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

## **5. Hoe bewaart u dit medicijn?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking, het etiket en de doos en na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit medicijn?**

De werkzame stof in dit medicijn is dimethylfumaraat.

*Dimethylfumaraat CF 120 mg, harde maagsapresistente capsules*

Elke harde maagsapresistente capsule bevat 120 mg dimethylfumaraat.

*Dimethylfumaraat CF 240 mg, harde maagsapresistente capsules*

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-7

Elke harde maagsapresistente capsule bevat 240 mg dimethylfumaraat.

De andere stoffen in dit medicijn zijn:

- Inhoud van de capsule: microkristallijne cellulose (E460), crospovidon (E1202), talk (E553b), povidon K30 (E1201), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b), triethylcitraat (E1505), methacrylzuur/ethyl acrylaat copolymeer (1:1), hypromellose (E464), titaandioxide (E171), triacetine (E1518)
- Capsule omhulsel: gelatine, titaandioxide (E171), briljantblauw FCF GD&C blauw 1 (E133), geel ijzeroxide (E172)
- Capsule opdruk: schellak (E904), kaliumhydroxide (E525), propyleenglycol (E1520), zwart ijzeroxide (E172), sterke ammoniakoplossing (E527))

### Hoe ziet Dimethylfumaraat CF eruit en wat zit er in een verpakking?

Dimethylfumaraat CF 120 mg, harde maagsapresistente capsules (maagsapresistente capsules): groene kap en witte romp, capsule omhulsel van 21,4 mm, de romp bedrukt met “DMF 120” in zwarte inkt, die witte tot gebroken witte minitabledten bevatten.

Dimethylfumaraat CF 240 mg, harde maagsapresistente capsules (maagsapresistente capsules): groene kap en romp, capsule omhulsel van 23,2 mm, de romp bedrukt met “DMF 240” in zwarte inkt, die witte tot nagenoeg witte minitabledten bevatten.

HDPE flessen met PP/HDPE dop met afdichting en silica droogmiddelhouder.

Slik het droogmiddel niet in.

oPA/Alu/PVC//Alu blisterverpakkingen of oPA/Alu/PVC//Alu eenheidsdoseringsblisterverpakking.

#### Dimethylfumaraat CF 120 mg, harde maagsapresistente capsules

14 capsules (blisterverpakking)

14x1 capsules (eenheidsdoseringsblisterverpakking)

100 capsules (fles)

#### Dimethylfumaraat CF 240 mg, harde maagsapresistente capsules

56 capsules (blisterverpakking)

56x1 capsules (eenheidsdoseringsblisterverpakking)

100 capsules (fles)

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

### Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E

4814 NE Breda

Nederland

Fabrikant:

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park

Paola, PLA 3000

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands		<b>Module 1</b> Administrative information and prescribing information
<b>Dimethylfumaraat CF 120 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132603	
<b>Dimethylfumaraat CF 240 mg</b> , harde maagsapresistente capsules	RVG 132604	
Dimethyl fumarate		
<b>1.3.1.3 Package leaflet</b>		1.3.1.3-8

Malta

Adalvo Limited  
Malta Life Sciences Park,  
Level 4, Building 1  
Sir Temi Zammit Buildings  
San Gwann, SGN 3000  
Malta

KeVaRo GROUP Ltd  
9 Tzaritza Elenora Str. Office 23  
Sofia 1618  
Bulgarije

**In het register ingeschreven onder:**

RVG 132603 Dimethylfumaraat CF 120 mg, harde maagsapresistente capsules  
RVG 132604 Dimethylfumaraat CF 240 mg, harde maagsapresistente capsules

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2024.**

Department of Regulatory Affairs	<b>Date:</b> 03-2024	<b>Authorisation</b>	<b>CM:</b> MvdA	<b>Rev.</b> 1.1	<b>Approved MEB</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------