

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Algofrencaps 400 mg capsule, zacht ibuprofen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts:
 - na 3 dagen bij jongeren,
 - na 3 dagen (in geval van koorts) of na 4 dagen (in geval van pijn) bij volwassenen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Algofrencaps en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Algofrencaps en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Ibuprofen hoort bij een groep medicijnen die niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID's) worden genoemd. Deze medicijnen geven verlichting van de klachten, omdat ze de reactie van het lichaam op pijn en koorts veranderen.

Algofrencaps wordt gebruikt bij volwassenen en jongeren met een lichaamsgewicht van 40 kg of meer (12 jaar en ouder), voor kortdurende behandeling van de volgende klachten:

- matige tot gemiddelde pijn, zoals hoofdpijn, menstruatiepijn en kiespijn;
- koorts bij verkoudheid.

Neem contact op met uw arts als u zich niet beter voelt of als de klachten erger worden:

- Jongeren van 12 jaar en ouder: na 3 dagen
- Volwassenen: na 3 dagen (bij koorts) en na 4 dagen (bij pijn)

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor ibuprofen of een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U heeft ooit last gehad van benauwdheid, astma, loopneus, zwelling of galbulten na het gebruik van acetylsalicylzuur of andere, vergelijkbare pijnstillers (NSAID's).
- U heeft een zweer, gat (perforatie) of bloeding van de maag of de twaalfvingerige darm, of u heeft dit duidelijk minstens 2 keer gehad.
- U heeft een voorgeschiedenis van een maag-darmbloeding of -perforatie bij eerder gebruik van NSAID's (niet-steroïde ontstekingsremmers).
- U lijdt aan een onverklaarde stoornis van de bloedaanmaak.
- U lijdt aan ernstig nier-, lever- of hartfalen.

- Tijdens de laatste 3 maanden van uw zwangerschap (zie de rubriek "Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid").
- U bent ernstig uitgedroogd door overgeven, diarree of te weinig drinken.
- U heeft een hersenbloeding (cerebrovasculaire bloeding) of een andere actieve bloeding.

Geef Algofrencaps niet aan jongeren met een lichaamsgewicht van minder dan 40 kg of aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt:

- als u lijdt aan systemische lupus erythematoses (SLE) of gemengde bindweefselziekte (aandoeningen van het immuunsysteem met gewrichtspijn, huiduitslag en koorts);
- als u een vorm van een erfelijke afwijking in de bloedaanmaak heeft (bijvoorbeeld: acute, intermitterende porfyrie) of problemen met de bloedstolling heeft;
- als u een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of gehad heeft;
- als uw nieren minder goed werken;
- als u leverproblemen heeft;
- als u kortgeleden een grote operatie ondergaan heeft;
- als u astma of een allergische aandoening heeft of gehad heeft, omdat u benauwd kunt worden;
- als u lijdt aan hooikoorts, neuspoliepen (bultjes in de neus) of chronisch obstructieve luchtwegaandoeningen, omdat er een verhoogde kans is op allergische reacties; allergische reacties kunnen zich presenteren als astma-aanvallen (zogenaamde analgetica-astma), plotselinge zwellingen (Quincke's oedeem) of als huiduitslag;
- als u andere medicijnen gebruikt, die de kans op zweren of bloedingen kunnen verhogen, zoals orale corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine), selectieve serotonineheropnameremmers (medicijnen tegen depressie) of antibloedplaatjesmiddelen als acetylsalicylzuur.

Er zijn meldingen geweest na het gebruik van ibuprofen van verschijnselen van allergische reactie, waaronder ademhalingsproblemen, zwelling van het gezicht en de nek (angio-oedeem) en pijn op de borst. Als u een van deze verschijnselen opmerkt, stop dan onmiddellijk met Algofrencaps en neem direct contact op met uw arts of met de spoedeisende hulp.

Andere waarschuwingen

- Langdurig gebruik van pijnstillers voor hoofdpijn kan verergering van de klachten veroorzaken. Als dit dat bij u het geval is, stop dan met Algofrencaps en neem contact op met uw arts.
- Gebruik Algofrencaps niet als u waterpokken (varicella) heeft.
- Als u Algofrencaps langdurig gebruikt, moeten uw bloed, lever en nieren regelmatig gecontroleerd worden.
- Gebruik van Algofrencaps in combinatie met andere NSAID's, zoals selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers, kan het risico op bijwerkingen verhogen en moet vermeden worden (zie de rubriek "Gebruikt u nog andere medicijnen?" hieronder).
- In het algemeen kan langdurig of veelvuldig gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers tot blijvende ernstige nierproblemen leiden en dit moet vermeden worden. Het risico neemt verder toe bij zoutverlies en uitdroging.
- Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij uitgedroogde jongeren.

Infecties

Algofrencaps kan symptomen van een infectie, zoals koorts en pijn, verbergen. Het is daarom mogelijk dat Algofrencaps de passende behandeling van een infectie vertraagt, wat kan leiden tot een verhoogd risico op complicaties. Dit is waargenomen in door bacteriën veroorzaakte longontsteking en bacteriële huidinfecties die kunnen voorkomen bij waterpokken. Gebruikt u dit medicijn terwijl u een infectie heeft, en blijven de klachten van uw infectie bestaan of worden ze erger? Dan moet u als jongere na 3 dagen en als volwassene na 3 dagen in geval van koorts of na 4 dagen bij pijn contact opnemen met een arts.

Ernstige huidreacties

Er zijn meldingen gedaan van ernstige huidreacties, waaronder exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse, geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) na een behandeling met ibuprofen. Stop met het gebruik van Algofrencaps en zoek onmiddellijk medische hulp als u één of meerdere klachten krijgt die verband houden met deze ernstige huidreacties die genoemd worden in rubriek 4.

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt als u:

- hartproblemen heeft, waaronder hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypassoperatie, een perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokte aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
- hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

U kunt de kans op bijwerkingen verkleinen door de minimale werkzame dosis te gebruiken voor een zo kort mogelijke tijd. Ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen.

Is een van de bovengenoemde omstandigheden op u van toepassing is? Neem dan contact op met een arts voordat u Algofrencaps gaat gebruiken.

Jongeren

Geef Algofrencaps niet aan jongeren met een lichaamsgewicht van minder dan 40 kg of aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Algofrencaps nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Algofrencaps kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld:

- bloedverdunners (dat zijn medicijnen die bloedstolling voorkomen, zoals acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine);
- bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bètablokkers zoals atenolol, angiotensine-II receptor-antagonisten, zoals losartan).

Sommige andere medicijnen kunnen ook invloed hebben op of beïnvloed worden door Algofrencaps. Vraag daarom altijd advies aan uw arts of apotheker voordat u Algofrencaps gebruikt samen met andere medicijnen.

Vertel het hen vooral als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

Andere NSAID's (ontstekingsremmers en pijnstillers), waaronder selectieve cyclo-oxygenase-2-remmers	Kunnen de kans op zweren of bloedingen in de maag of darmen verhogen.
Digoxine (voor hartfalen)	De werking van digoxine kan sterker worden.
Glucocorticoïden (medicijnen die cortison of cortison-achtige stoffen bevatten)	Kunnen de kans op zweren of bloedingen in de maag of darmen verhogen.
Trombocytenaggregatieremmers	Kunnen de kans op zweren of bloedingen in de maag of darmen verhogen.

Fenytoïne (voor epilepsie)	De werking van fenytoïne kan sterker worden.
Selectieve serotonineheropnameremmers (medicijnen tegen depressie)	Kunnen de kans op bloeding verhogen.
Lithium (een medicijn tegen manisch-depressieve stoornissen en depressie)	De werking van lithium kan sterker worden.
Probenecide en sulfinpyrazon (medicijnen tegen jicht)	Ibuprofen wordt mogelijk langzamer door het lichaam afgebroken.
Kaliumsparende diuretica	Kunnen leiden tot een te hoge hoeveelheid kalium in het bloed (hyperkaliëmie).
Methotrexaat (een medicijn tegen kanker of reuma)	Het effect van methotrexaat kan sterker worden.
Tacrolimus en cyclosporine (immunosuppressiva)	Er kan nierbeschadiging optreden.
Zidovudine (een medicijn tegen AIDS)	Hiv-positieve patiënten met hemofilie hebben groter risico op bloedingen in gewrichten of bloedingen die tot zwelling leiden.
Sulfonylureumderivaten (tegen diabetes)	Beide medicijnen hebben invloed op elkaar. Hierdoor werken ze beter, slechter of anders.
Chinolon-antibiotica	De kans op convulsies (epileptische aanvallen) kan toenemen.
Mifepriston (gebruikt om een zwangerschap af te breken)	Het effect van mifepriston kan minder worden.
Acetylsalicylzuur (lage dosis)	Het bloedverdunnende effect kan minder worden.
Bloedverdunnende medicijnen (zoals warfarine)	Ibuprofen kan de werking van deze medicijnen versterken.
Voriconazol en fluconazol (CYP2C9-remmers), gebruikt voor schimmelinfecties	Het effect van ibuprofen kan sterker worden. Vooral als u een hoge dosering ibuprofen gebruikt. Het kan nodig zijn om uw dosis ibuprofen te verlagen.
Aminoglycosiden (geneesmiddelen tegen bepaalde typen bacteriën)	NSAID's kunnen ervoor zorgen dat aminoglycosiden minder goed uit het lichaam worden afgevoerd.
Cholestyramine (gebruikt bij de behandeling van een hoog cholesterol)	Ibuprofen wordt minder en langzamer opgenomen. Neem de medicijnen met een tussentijd van minimaal 1 uur.

Waarop moet u letten met alcohol?

U mag geen alcohol drinken tijdens het gebruik van Algofrencaps. Sommige bijwerkingen, zoals die welke van invloed zijn op het maag-darmkanaal of het centrale zenuwstelsel, treden mogelijk eerder op wanneer alcohol tegelijk met Algofrencaps wordt ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Vertel uw arts dat u zwanger bent, als u Algofrencaps gebruikt.

Neem dit medicijn niet in tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Het kan nier- en hartproblemen bij uw ongeboren baby veroorzaken. Het kan van invloed zijn op uw en uw baby's bloedstolling en ervoor zorgen dat de bevalling later plaatsvindt of langer duurt dan verwacht. U mag

Algofrencaps niet innemen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap, tenzij aanbevolen door uw arts. Als Algofrencaps langer dan een paar dagen wordt ingenomen vanaf 20 weken zwangerschap, kan dit nierproblemen bij uw ongeboren baby veroorzaken die kunnen leiden tot een lage hoeveelheid vruchtwater dat de baby omringt (oligohydramnion) of vernauwing van een bloedvat (ductus arteriosus) in het hart van de baby. Indien u langer dan een paar dagen behandeld moet worden, kan uw arts extra toezicht aanbevelen.

Borstvoeding

Er komen slechts kleine hoeveelheden van ibuprofen en afbraakproducten daarvan in de moedermelk terecht. Ibuprofen kan tijdens de borstvoeding gebruikt worden, als u zich aan de aanbevolen dosering houdt en het zo kort mogelijk gebuikt.

Vrouwelijke vruchtbaarheid

Praat met uw arts voordat u Algofrencaps gebruikt, als u problemen heeft om zwanger te worden. Algofrencaps hoort bij een groep medicijnen (NSAID's) die de vruchtbaarheid van vrouwen kan verminderen. Dit effect verdwijnt als u stopt met het gebruik.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u dit medicijn kort gebruikt en in de normale dosering, dan heeft het geen of bijna geen invloed op hoe goed u kunt rijden of machines bedienen. Krijgt u tijdens het gebruik van ibuprofen last van duizeligheid, slaperigheid, draaierigheid of problemen met zien? Dan mag u niet rijden en geen machines bedienen. Deze effecten kunnen erger worden als u ibuprofen samen met alcohol gebruikt.

Algofrencaps bevat sorbitol.

Dit medicijn bevat 81,270 mg sorbitol in elke capsule.

Algofrencaps bevat Ponceau 4R.

Dit kan allergische reacties veroorzaken.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd precies in zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosis, tenzij uw arts een andere dosering voorschrijft, is als volgt:

Dosering

Volwassenen en jongeren met een lichaamsgewicht van 40 kg of meer (12 jaar en ouder)

Startdosering: 1 capsule (400 mg ibuprofen) met water, daarna zo nodig 1 capsule (400 mg ibuprofen) elke 6 uur.

Neem niet meer dan 3 capsules (1200 mg) binnen een periode van 24 uur.

Wijze van toediening

Via de mond innemen. Niet op kauwen. Dit kan irritatie aan mond of keel veroorzaken.

Heeft u een gevoelige maag? Neem Algofrencaps dan in tijdens het eten. Als Algofrencaps kort na de maaltijd wordt ingenomen, kan het wat langer duren voordat het werkt. Als dit gebeurt, neem dan niet meer Algofrencaps dan wordt aangeraden. Wacht tot het tijd is voor de volgende dosis.

Duur van de behandeling

Dit medicijn is **alleen** bedoeld voor **kort gebruik**. Neem altijd de laagste mogelijke dosis die bij u werkt, en gebruik het zo kort mogelijk. Als u een infectie hebt, neem dan direct contact op met een arts als de klachten (zoals koorts en pijn) blijven bestaan of erger worden (zie rubriek 2).

Gebruik bij jongeren

Als bij jongeren dit medicijn langer dan 3 dagen nodig is of als de klachten verergeren, moet contact worden opgenomen met een arts.

Gebruik bij volwassenen

Als u Algofrencaps langer nodig heeft dan 3 dagen voor koorts of 4 dagen voor pijn, vraag dan advies aan uw arts.

Bespreek het ook met uw arts of apotheker als u denkt dat het effect van dit medicijn sterker of zwakker is dan u had verwacht.

Gebruik bij kinderen

Niet geschikt voor jongeren met een lichaamsgewicht van minder dan 40 kg of kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen zijn andere, geschiktere vormen van ibuprofen beschikbaar.

Patiënten met leverproblemen

Patiënten met leverproblemen moeten eerst contact opnemen met een arts voordat ze Algofrencaps kunnen gebruiken.

Patiënten met nierproblemen

Patiënten met nierproblemen moeten eerst contact opnemen met een arts voordat ze Algofrencaps kunnen gebruiken.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Wanneer u meer Algofrencaps ingenomen heeft dan toegestaan of als een jongere per ongeluk dit medicijn ingenomen heeft, moet u onmiddellijk naar een arts of de dichtstbijzijnde spoedafdeling gaan en de verpakking van uw medicijn en deze bijsluiter meenemen.

De mogelijke klachten zijn misselijkheid, overgeven (kan bloedbraken zijn), bloed bij de ontlasting (maag-darmbloeding), oorsuizen, hoofdpijn, maagpijn, diarree en trillende oogbewegingen. Bij hoge doseringen zijn de volgende klachten gemeld: zwakte en duizeligheid, slaperigheid, verwardheid, desoriëntatie (niet weten hoe laat het is of waar u bent), verminderd bewustzijn, het koud aanvoelen van het lichaam, pijn op de borst, hartkloppingen, aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen (convulsies, vooral bij jongeren), bloed in urine en ademhalingsproblemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

U kunt de kans op bijwerkingen verkleinen door het medicijn zo kort mogelijk te gebruiken in de laagst mogelijke dosering die nodig is om uw klachten te verlichten. U kunt last krijgen van een van de bekende bijwerkingen van NSAID's (zie hieronder). Als dit gebeurt, of als u zich zorgen maakt, stop dan met het innemen van dit medicijn en neem zo snel mogelijk contact op met uw arts. Ouderen die dit medicijn gebruiken hebben een grotere kans op problemen die te maken hebben met bijwerkingen.

STOP MET HET GEBRUIK van dit medicijn en zoek direct medische hulp bij:

- **klachten van darmbloeding**, zoals: hevige buikpijn, zwarte, teerachtige ontlasting, overgeven van bloed of donkere deeltjes die lijken op gemalen koffie;
- **klachten van zeer zeldzame, maar ernstige allergische reacties**, zoals verslechtering van astma, onverklaarbaar piepende ademhaling, benauwdheid, zwelling van gezicht, tong of keel, moeite met

ademhalen, snelle hartslag, plotselinge bloeddrukdaling die kan leiden tot shock. Dit kan zelfs gebeuren als u dit medicijn voor de eerste keer inneemt;

- **ernstige huidreacties**, zoals:

- rode, niet-verheven, 'schietschijf'-achtige of cirkelvormige plekken op de romp, vaak met blaren in het midden, schilfering van de huid, zweren in of op de mond, keel, neus, geslachtsdelen en ogen. Aan deze ernstige huiduitslag kunnen koorts en griepachtige klachten voorafgaan [exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse];
- wijdverspreide huiduitslag, hoge lichaamstemperatuur en vergrote lymfeklieren (DRESS-syndroom);
- een rode, schilferige, wijdverspreide huiduitslag met bultjes onder de huid en blaasjes, die gepaard gaat met koorts. De klachten doen zich meestal voor aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose);

- **pijn op de borst**, wat een teken kan zijn van een mogelijk ernstige allergische reactie die Kounis-syndroom wordt genoemd.

Neem contact op met de arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, als de bijwerkingen erger worden of als u last krijgt van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat.

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- maag-darmklachten, zoals brandend maagzuur, buikpijn, misselijkheid, problemen met uw spijsvertering, overgeven, winderigheid, diarree, verstopping; een beetje bloedverlies uit de maag en/of darm kan in zeldzame gevallen leiden tot bloedarmoede;

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- zweren in maag of darm, soms met bloeding en gat in uw maag of darmen (perforatie), ontsteking en zweren van het mondslijmvlies (ulceratieve stomatitis), ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis), verergering van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn;

- ziekten van het centrale zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, duizeligheid, lecht slapen, onrustig, prikkelbaar of vermoeid zijn;

- problemen met zien;

- allergische reacties als huiduitslag of jeuk en astma-aanvallen. Stop met het gebruik van Algofrencaps en neem direct contact op met uw arts;

- verschillende soorten huiduitslag.

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- tinnitus (oorsuizen);

- nierbeschadiging (papilnecrose) en verhoogde hoeveelheid urinezuur in het bloed;

- slechter horen;

- verhoogde hoeveelheid ureum in het bloed;

- verlaagde hoeveelheid hemoglobine in het bloed.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- zwelling (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen zijn gemeld tijdens behandeling met NSAID's;

- ontsteking van de slokdarm (oesofagus) of alvleesklier (pancreas), vorming van membraan-achtige vernauwingen in de dunne en dikke darm (intestinale membraaneuze stricturen);

- ernstige infecties van de huid en de weke delen zijn voorgekomen tijdens waterpokkeninfecties (varicella);

- minder plassen dan normaal en zwelling (vooral bij patiënten met hoge bloeddruk of nierproblemen); zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) die kan leiden tot plotseling nierfalen; als een van de bovenstaande klachten optreedt, of als u zich beroerd voelt, stop dan met Algofrencaps en vraag direct advies aan uw arts; deze klachten kunnen namelijk de eerste tekenen van nierbeschadiging of nierfalen zijn;

- problemen met de aanmaak van bloedcellen; de eerste klachten zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige wonden in de mond, griepachtige klachten, ernstige vermoeidheid, neusbloedingen en huidbloeding; stop in die gevallen direct met de behandeling en vraag advies aan een arts; gebruik geen pijnstillers of andere medicijnen die de koorts te verminderen (antipyretische medicijnen);
- psychotische reacties en depressie;
- verergering van infectiegerelateerde ontstekingen (zoals necrotiserende fasciitis) zijn beschreven bij behandeling met NSAID's; als klachten van infectie optreden of verergeren tijdens het gebruik van Algofrencaps, ga dan direct naar een arts die kan beoordelen of het nodig is om de infectie te behandelen met antibiotica of andere anti-infectieuze medicijnen;
- hoge bloeddruk, hartkloppingen, hartfalen, hartaanval;
- leverproblemen, leverbeschadiging, vooral tijdens langdurige behandeling, leverfalen, plotselinge ontsteking van de lever (hepatitis);
- verschijnselen van hersenvliesontsteking die niet veroorzaakt is door een bacterie, met nekstijfheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of bewustzijnsvermindering zijn gemeld tijdens gebruik van ibuprofen. Patiënten met auto-immuunziekten (systemische lupus erythematoses, gemengde bindweefselziekte) hebben een grotere kans op deze bijwerkingen. Neem bij deze bijwerkingen direct contact op met een arts;
- ernstige vormen van huidreacties, zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse, Lyell-syndroom), haaruitval (alopecia).
- ernstige algemene overgevoeligheidsreacties;
- verergering van astma en bronchospasme;
- ontsteking van de bloedvaten (vasculitis).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- er kan een ernstige huidreactie optreden die bekend staat als het DRESS-syndroom (frequentie niet bekend); klachten van DRESS zijn onder andere: huiduitslag, koorts, zwelling van lymfeklieren en een toename van eosinofielen (een soort witte bloedcellen);
- een rode, schilferige, wijdverspreide huiduitslag met bultjes onder de huid en blaasjes. De bultjes bevatten etter. De uitslag zit voornamelijk bij de huidplooien, romp en armen, en gaat gepaard met koorts. Hier heeft u meestal last van aan het begin van de behandeling (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose of AGEP). Stop met het gebruik van Algofrencaps als u deze klachten krijgt en zoek onmiddellijk medische hulp; Zie ook rubriek 2.
- de huid wordt gevoelig voor licht.

Medicijnen als Algofrencaps kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogde kans op een hartaanval (hartinfarct) of beroerte.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Dit medicijn buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is ibuprofen. Elke zachte capsule bevat 400 mg ibuprofen.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: macrogol 600 (E1521), kaliumhydroxide (E525), gelatine, sorbitol (vloeistof, gedeeltelijk gedehydrateerd, E420), Ponceau 4R (E124) en gezuiverd water.

Hoe ziet Algofrencaps eruit en wat zit er in een verpakking?

Algofrencaps zijn rode, ovale, doorschijnende zachte capsules.

Blisterverpakkingen van ondoorzichtig PVC/PVDC-aluminium.

Verpakkingsgrootten: 10 of 20 zachte capsules.

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Ioulia & Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories S.A (alternatieve naam: Intermed S.A)

27 Kalyftaki

GR-145 64 Kifisia, Attiki

Griekenland

Fabrikant

Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A.

14th km National Road 1

GR-145 64 Kifisia

Griekenland

In het register ingeschreven onder:

RVG 132790 - Algofrencaps 400 mg zachte capsules

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Cyprus: Algovil Rapid 400 mg capsule, soft

Denemarken: Algovil

Frankrijk: Ibuprofen Intermed 400 mg, capsule molle

Griekenland: Algofren Rapid

Nederland: Algofrencaps 400 mg zachte capsules

Zweden: Algovil 400 mg capsule, soft

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2025.