Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Algyd 25 mg/25 mg pleister
lidocaïne en prilocaïne

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Algyd en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Algyd en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Algyd bevat twee werkzame stoffen: lidocaïne en prilocaïne. Deze stoffen horen bij een groep medicijnen die lokale anesthetica heten.
Dit medicijn verdooft het oppervlak van de huid voor korte tijd. Het wordt op de huid aangebracht voordat u bepaalde medische ingrepen krijgt. Het zorgt ervoor dat u geen pijn op de huid voelt. U voelt misschien wel nog druk en aanraking.

Volwassenen, jongeren tot 18 jaar en kinderen
Dit medicijn kan worden gebruikt om de huid te verdoven bij:
- Het inbrengen van een naald (bijvoorbeeld bij een injectie of een bloedonderzoek).
- Kleine huidoperaties.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?
- U bent allergisch voor lidocaïne of prilocaïne, andere plaatselijke verdovingsmiddelen die hier op lijken, of een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?
Neem contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.
- als u of uw kind een zeldzame erfelijke ziekte heeft die glucose-6-phosphatedehydrogenasedeficiëntie heet. Deze ziekte heeft invloed op het bloed.
- als u of uw kind een probleem heeft met de hoeveelheid bloedkleurstof in het bloed. Dit heet methemoglobinemie.
- gebruik dit medicijn niet op plekken met huiduitslag, een snee, schaafwonden of andere open wonden. Heeft u een van deze problemen? Neem dan eerst contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u de pleister gebruikt.
- als u of uw kind een jeukende huidziekte heeft die atopische dermatitis heet. Een kortere inwerktijd kan genoeg zijn. Een inwerktijd van meer dan 30 minuten kan zorgen voor het vaker voorkomen van een plaatselijke huidreactie (zie ook rubriek 4 “Mogelijke

bijwerkingen").

Zorg dat dit medicijn niet in contact komt met de ogen. Dit kan zorgen voor irritatie. Komt het medicijn per ongeluk toch in uw oog? Spoel uw oog dan meteen met lauw water of een zoutoplossing (natriumchloride). Wees voorzichtig tot het gevoel in uw ogen terugkomt, om te zorgen dat er niets in uw oog komt.

Gebruikt u dit medicijn voordat u wordt ingeënt met een levende werkzame stof die ervoor zorgt dat het lichaam zelf antistoffen maakt tegen een besmettelijke ziekte (levend vaccin) (bijvoorbeeld het tuberculosevaccin)? Dan moet u na een afgesproken tijd weer terug naar uw arts of verpleegkundige om het resultaat van de vaccinatie te controleren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Bij zuigelingen/pasgeborenen jonger dan 3 maanden wordt vaak een tijdelijke, klinisch niet belangrijke verhoging van de hoeveelheid bloedkleurstof in het bloed gezien (methemoglobinemie). Dit wordt gezien tot maximaal 12 uur nadat dit medicijn is aangebracht.
De werkzaamheid van dit medicijn bij hielprikken bij pasgeborenen kon niet worden bewezen tijdens klinische onderzoeken.
Dit medicijn mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 maanden als zij op hetzelfde moment behandeld worden met andere medicijnen die invloed hebben op de hoeveelheid bloedkleurstof in het bloed (methemoglobinemie). Bijvoorbeeld sulfonamiden. Zie ook rubriek 2 "Gebruikt u nog andere medicijnen?" hieronder.
Dit medicijn mag niet worden gebruikt bij te vroeg geboren zuigelingen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?
Gebruikt u naast Algyd nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel het aan uw arts. Algyd kan namelijk invloed hebben op de werking van sommige medicijnen. Sommige medicijnen kunnen ook invloed hebben op de werking van Algyd.

Vertel het uw arts of apotheker vooral als u of uw kind kort geleden de volgende medicijnen heeft gebruikt:
- Medicijnen voor de behandeling van infecties. Zoals sulfonamiden en nitrofurantoïne.
- Medicijnen voor de behandeling van epilepsie. Zoals fenytoïne en fenobarbital.
- Andere medicijnen die plaatselijk verdoven (lokale anesthetica).
- Cimetidine of bètablokkers. Deze kunnen de hoeveelheid lidocaïne in het bloed verhogen. Dit is klinisch niet belangrijk bij behandeling met lidocaïne/prilocaïne in de aanbevolen dosering voor korte tijd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.
Gebruikt u dit medicijn af en toe tijdens de zwangerschap? Dan heeft dit waarschijnlijk geen negatieve invloed op het ongeboren kind.
De werkzame stoffen in dit medicijn (lidocaïne en prilocaïne) komen in de moedermelk. De hoeveelheid is zo laag dat er over het algemeen geen risico voor het kind is.
Dierstudies hebben geen verstoring van de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid laten zien.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit medicijn heeft bij de aanbevolen doseringen geen of bijna geen invloed op hoe goed u kunt rijden of machines kunt gebruiken.

Dit medicijn bevat macrogolglycerolhydroxystearaat (polyoxyl gehydrogeneerde ricinusolie)
Macrogolglycerolhydroxystearaat kan zorgen voor huidreacties.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik van dit medicijn
- Waar u de pleister moet aanbrengen, hoeveel pleisters u moet gebruiken en hoe lang u deze moet laten inwerken hangt af van waarom u dit medicijn gebruikt.
- Uw arts, apotheker of verpleegkundige zal de pleister aanbrengen of u laten zien hoe u de pleister zelf kunt aanbrengen.

Gebruik dit medicijn niet op de volgende gebieden:
- Sneetjes, schaafplekken of wonden.
- Huiduitslag of eczeem.
- Dicht bij de ogen.
- In de mond.

Gebruik op de huid voor kleine ingrepen (zoals het inbrengen van een naald of kleine huidoperaties):
- De pleister wordt op de huid aangebracht. Uw arts, apotheker of verpleegkundige zal vertellen waar de pleister moet worden aangebracht.
- De pleister wordt vlak voor de ingreep er af gehaald.
- Bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder is de gebruikelijke dosering 1 of meer pleisters.
- Bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder moet de pleister minimaal 60 minuten voor de ingreep worden aangebracht. De pleister mag niet meer dan 5 uur van tevoren worden aangebracht.
- Bij kinderen is het aantal te gebruiken pleisters en de inwerktijd afhankelijk van de leeftijd. Uw arts, apotheker of verpleegkundige zal vertellen hoeveel pleisters u moet gebruiken en wanneer u deze moet aanbrengen.


Gebruik bij kinderen
Gebruik op de huid voor kleine ingrepen (zoals het inbrengen van een naald of kleine huidoperaties):
Inwerktijd: ongeveer 1 uur.
Pasgeborenen en zuigelingen van 0 tot 2 maanden: 1 pleister aanbrengen op de huid waar dit nodig is. Inwerktijd: niet langer dan 1 uur. Per 24 uur mag maar 1 enkele dosis worden gegeven. Het formaat van de pleister maakt het minder geschikt voor gebruik op sommige lichaamsdelen bij pasgeborenen en zuigelingen.
Zuigelingen in de leeftijd van 3 tot 11 maanden: Tot 2 pleisters aanbrengen op de huid waar dit nodig is. Inwerktijd: ongeveer 1 uur, niet langer dan 4 uur.
Kinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar: Tot 10 pleisters aanbrengen op de huid waar dit nodig is. Inwerktijd: ongeveer 1 uur, niet langer dan 5 uur.
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar: Tot 20 pleisters aanbrengen op de huid waar dit nodig is. Inwerktijd: ongeveer 1 uur, niet langer dan 5 uur.

De maximale dosering die gegeven mag worden aan zuigelingen en kinderen vanaf 3 maanden oud is 2 doseringen per 24 uur (zoals hierboven beschreven), met een periode van minimaal 12 uur tussen de doseringen.

Dit medicijn kan worden gebruikt bij kinderen met een huidziekte die atopische dermatitis heet. De inwerktijd is dan 30 minuten, niet langer.

Bij het aanbrengen van de pleister is het erg belangrijk om precies de uitleg hieronder te volgen:
Dit medicijn moet minimaal 1 uur voor de ingreep worden aangebracht. Behalve bij patiënten met atopische dermatitis, zie “Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?”. Verwijder lichaamshaar in het te behandelen gebied voor het aanbrengen als dit nodig is. De pleister mag niet worden geknipt of verdeeld in kleinere stukken.

1. Zorg dat het te verdoven gebied van de huid schoon en droog is.
Pak het aluminium flapje in de hoek van de pleister vast en buig het naar achteren.
Pak vervolgens de hoek van de huidkleurige pleisterlaag vast. Zorg dat de twee lagen in de hoek goed van elkaar gescheiden zijn voordat u verder gaat.



2. Trek de twee lagen van elkaar, zodat het zelfklevende oppervlak los komt van de beschermlaag, zoals in de afbeelding.
Zorg ervoor dat u het witte ronde deel niet aanraakt. Dit bevat de werkzame stoffen van dit medicijn.



3. Druk niet op het midden van de pleister. Dit zou er voor kunnen zorgen dat werkzame stoffen van dit medicijn zich onder de plakrand verspreiden. De pleister kan hierdoor niet meer goed genoeg op de huid plakken. Druk de pleister stevig vast aan de randen om hem goed aan de huid te laten plakken.



4. Het tijdstip van aanbrengen kan makkelijk op de pleister worden geschreven. Hiervoor kan een balpen worden gebruikt.

5. Laat de pleister minimaal 1 uur zitten. Behalve bij patiënten met atopische dermatitis, zie “Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?”.
Bij kinderen jonger dan 3 maanden mag de pleister niet langer dan 1 uur blijven zitten.

6. Wanneer de inwerktijd voorbij is, moet de pleister van de huid worden gehaald.

<u>Gebruik op de huid voor het verwijderen van vlekken die lijken op wratten (mollusca):</u>

- Dit medicijn kan worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met een huidziekte die atopische dermatitis heet.
- De gebruikelijke dosering hangt af van de leeftijd van het kind. De inwerktijd is 30 tot 60 minuten (30 minuten als de patiënt atopische dermatitis heeft). Uw arts, apotheker of verpleegkundige zal u vertellen hoeveel pleisters u moet gebruiken.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?
Neem meteen contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige wanneer u te veel van dit medicijn heeft gebruikt. Ook als u geen last heeft van klachten.
De klachten waar u last van kunt krijgen als u te veel van dit medicijn gebruikt, staan hieronder. Deze klachten zullen waarschijnlijk niet optreden als u dit medicijn gebruikt zoals aanbevolen.

- Licht gevoel in het hoofd of duizelig zijn.
- Tintelingen van de huid rondom de mond en geen gevoel van de tong.
- Abnormale smaak.
- Wazig zien.
- Oorsuizen.
- Er is ook een kans op het krijgen van een probleem met de hoeveelheid bloedkleurstof in het bloed (acute methemoglobinemie). Deze kans is groter wanneer sommige medicijnen samen met Algyd worden gebruikt. Krijgt u hier last van? Dan wordt de huid blauwgrijs van kleur door te weinig zuurstof.

Bij ernstige gevallen van overdosering kunt u last krijgen van klachten zoals aanvallen van bewusteloos zijn met spiertrekkingen (stuipen), lage bloeddruk, langzamer ademhalen, ademhalingsstilstand en veranderde hartslag. Deze klachten kunnen levensbedreigend zijn.

België: Wanneer u teveel van Algyd heeft gebruikt of ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 245 245).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u last heeft van de volgende bijwerkingen of als deze niet lijken weg te gaan. Vertel het uw arts als er andere dingen zijn waar u ziek van wordt tijdens het gebruik van dit medicijn.
Er kan een milde reactie optreden in het gebied waar dit medicijn is aangebracht (bleekheid of roodheid van de huid, lichte zwelling, in het begin een branderig gevoel of jeuk). Dit zijn normale reacties op de pleister en de verdoving. Ze zullen snel verdwijnen zonder dat er maatregelen nodig zijn.
Krijgt u last van vervelende of abnormale klachten terwijl u dit medicijn gebruikt? Stop dan met het gebruik. Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts of apotheker.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):
- Tijdelijke plaatselijke huidreacties in het behandelde gebied (bleekheid, roodheid, zwelling)

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):
- In het begin een beetje branderig gevoel, jeuk of warmte in het behandelde gebied.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
- Allergische reacties. Dit kan in zeldzame gevallen zorgen voor een anafylactische shock (huiduitslag, zwelling, koorts, ademhalingsproblemen en flauwvallen).
- Bloedziekte (methemoglobinemie).
- Kleine puntvormige bloeding in het behandelde gebied. Vooral bij kinderen met eczeem na langere inwerktijden.
- Irritatie van de ogen als dit medicijn per ongeluk in contact komt met de ogen tijdens de behandeling van de huid.

Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen worden gezien
Een bloedziekte wordt vaker gezien bij pasgeborenen en zuigelingen van 0 tot 12 maanden (methemoglobinemie). Vaak in verband met een overdosis.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via :

België
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
www.fagg.be
Afdeling Vigilantie:
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be.

Nederland
Nederlands Bijwerkingen Centrum LarebWebsite: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de pleister na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25ºC.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stoffen in dit medicijn zijn lidocaïne en prilocaïne. 25 mg lidocaïne en 25 mg prilocaïne.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: gehydrogeneerde polyoxyethyleen ricinusolie (Croduret-54), carbomeer (carbopol 974P), natriumhydroxide en gezuiverd water.
  Samenstelling van de pleister: laminaatrug (aluminium/kunststof), absorberende schijf (cellulose), ronde ring van klevend schuim (PE), kleefstof (acrylaat).

Hoe ziet Algyd eruit en wat zit er in een verpakking?
Dit medicijn is een zelfklevende pleister.
Verpakking van 1, 2, 3 of 20 stuks.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder:
Laboratoires MEDGEN
126 rue d'Alésia
75014 Parijs
Frankrijk

Fabrikant:
ADHEXPHARMA
42-44 rue de Longvic
21300 Chenôve
Frankrijk

Afleveringswijze
België: Op medisch voorschrift
Nederland: UR

In het register ingeschreven onder:
België: BExxxxx
Nederland: RVG 134685

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

België	Algyd 25 mg/25 mg pleister
Griekenland	Algyd
Italië	Lidril 5%, Cerotto medicato
Luxemburg	Algyd
Nederland	Algyd 25 mg/25 mg, pleister
Spanje	Anelid

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2026.