Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Hytrin 2, tabletten 2 mg
Hytrin 5, tabletten 5 mg
Hytrin 10, tabletten 10 mg

terazosinehydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit medicijn niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Hytrin en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Hytrin en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Hytrin behoort tot de groep van de zogenaamde alfablokkers. Een alfablokker zorgt er onder andere voor dat de spierwand van de blaashals en de prostaat minder gespannen zijn. Hierdoor stroomt urine makkelijker door.
Hytrin kan worden toegepast bij de behandeling van de verschijnselen van goedaardige prostaatvergroting. Het is bestemd voor patiënten die in afwachting zijn van een prostaatoperatie.
Hytrin is bedoeld voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter;
- U bent allergisch voor andere geneesmiddelen die alfablokkers worden genoemd;
- U heeft een leverfunctiestoornis;
- U heeft bepaalde hartaandoeningen waarbij de afvoer van het bloed uit het hart belemmerd is of bepaalde pericardiale aandoeningen;

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Behandeling met Hytrin kan, in bepaalde gevallen, leiden tot een zeer sterke bloeddrukdaling als gevolg waarvan de patiënt duizeligheid of het gevoel kan krijgen om flauw te vallen, kan ervaren. Als de patiënt een van deze tekenen bemerkt, moet hij/zij gaan liggen of gaan zitten totdat hij/zij zich beter voelt of de tekenen zijn verdwenen.

Er wordt geadviseerd voorzichtig te zijn bij patiënten met een voorgeschiedenis van mictiesyncope (flauwvallen na het urineren).

Als u een oogoperatie voor grijze staar (vertroebeling van de lens) moet ondergaan, informeer dan uw oogarts vóór de operatie dat u Hytrin gebruikt of dat u Hytrin heeft gebruikt. Dit is van belang omdat Hytrin complicaties tijdens de operatie kan veroorzaken, die voorkomen kunnen worden als uw specialist hierop is voorbereid.

Het gebruik van terazosine kan de resultaten van bepaalde laboratoriumtesten wijzigen. Vermeld bij het verstrekken van een bloed- of urinestaal voor laboratoriumtesten steeds dat u met Hytrin behandeld wordt.
Als het gebruik van dit geneesmiddel gedurende meerdere dagen wordt stopgezet, moet de behandeling opnieuw worden gestart met het aanvankelijke dosisregime.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Hytrin wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Ouderen
De dosering dient bij ouderen zo laag mogelijk gehouden te worden, en dosisverhogingen moeten onder strikt toezicht gebeuren.

Patiënten met leverfunctiestoornissen
Informeer uw arts als u lijdt aan leverfunctiestoornissen. De dosis kan eventueel aangepast worden.
Patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Gebruikt u nog andere medicijnen?
Gebruikt u naast Hytrin nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het kan noodzakelijk zijn om de dosis Hytrin te verlagen en vervolgens bij te stellen.

Het is vooral belangrijk uw arts te vertellen dat u
- geneesmiddelen neemt om hoge bloeddruk, hartkramp en hartritmestoornissen te behandelen (calciumkanaalblokkers, bvb. amlodipine, verapamil, diltiazem), ACE-remmers (bvb. captopril, fosinopril, ramipril) of plastabletten (diuretica, bvb. bendroflumethiazide, furoseminde, sprironlactone), die kunnen leiden tot een ernstige daling van de bloeddruk.
  Het kan nodig zijn om de dosis van deze middelen te verlagen om te vermijden dat de bloeddruk te laag zakt.
- Geneesmiddelen die worden gebruikt omerectiestoornissen te behandelen, zoals sildenafil, tadalafil, vardenafil.
- Voorzichtigheid is ook geboden wanneer terazosine gelijktijdig wordt toegediend met geneesmiddelen die de leverfunctie kunnen beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Het geneesmiddel kan bij zwangere vrouwen worden gebruikt enkel wanneer de arts oordeelt dat de verwachte voordelen voor de moeder opwegen tegen het potentiële risico voor de foetus. Terasozine dient niet te worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Hytrin-tabletten hebben een grote invloed op het vermogen om wagens te besturen en machines te gebruiken.
Bijwerkingen zoals duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of sufheid kunnen voorkomen, voornamelijk bij het begin van de behandeling of bij verhoging van de dosis. Dit kan in wisselende mate een invloed hebben op uw vermogen om veilig te werken of een voertuig te besturen.
- Bestuur geen voertuig.
- Gebruik geen gevaarlijk gereedschap en/of bedien geen gevaarlijke machines.

Hytrin bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering is afhankelijk van de ernst van uw aandoening.

De begindosering bedraagt 1 tablet à 1 mg. Neem de begindosis in voor het slapen gaan.

Na 3 dagen wordt begonnen met 1 tablet à 2 mg eenmaal per dag. Neem deze dosis gedurende 11 dagen.

Na deze dosering zal uw arts de vervolgdosering voorschrijven. Deze zal meestal 5 tot 10 mg per dag bedragen.

Wanneer de behandeling met Hytrin gedurende enige dagen is onderbroken moet opnieuw worden begonnen met de startverpakking.

De aanbevolen doseringen zijn niet allemaal mogelijk met dit medicijn; er zijn echter medicijnen met een lagere sterkte dan 2 mg beschikbaar.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
Hytrin wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Ouderen
De dosis dient zo laag mogelijk gehouden te worden bij ouderen en dosisverhogingen dienen nauwkeurig te worden opgevolgd.

Gebruik bij patiënten met nierfunctiestoornissen
Het is niet nodig om de dosis aan te passen voor deze patiënten.

Gebruik bij patiënten met leverfunctiestoornissen
Als u lijdt aan leverproblemen, dan zal uw dosis aangepast worden. Bij een heel slechte leverfunctie zal uw arts u dit geneesmiddel niet voorschrijven.

Gebruik in combinatie met thiazidediuretica en andere antihypertensieve middelen
De dosis Hytrin moet worden verminderd en indien nodig moet er een dosisaanpassing worden uitgevoerd.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?
Gebruik van teveel Hytrin kan leiden tot een te lage bloeddruk. Als u teveel Hytrin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?
Wanneer u vergeten bent om Hytrin in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van de volgende dag doen. Neem echter nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Houd wel rekening met het eventueel optreden van duizeligheid na inname (waar u tijdens uw slaap minder last van zult hebben). Bent u meerdere dagen achter elkaar vergeten Hytrin in te nemen, neem dan contact op met uw arts. Uw behandeling moet weer opnieuw worden ingesteld.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn
Wanneer plotseling met Hytrin gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen. Stop niet op eigen initiatief met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de behandeling zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken. Sommige bijwerkingen zijn ernstig. Als u één van de volgende bijwerkingen ervaart, dan dient u te stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken:

- Ernstige huidreacties die worden gekenmerkt door rode vlekken of blaren of andere uitgebreide huidreacties;
- Ernstige allergische reactie die een zwelling van het gezicht of de keel veroorzaakt

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op 10 patiënten
- Duizeligheid
- Hartkloppingen (onregelmatige hartslag die u kunt voelen)
- Slaperigheid (somnolentie)
- Hoofdpijn
- Zwakte (fysiek en mentaal)
- Versnelde hartslag (tachycardie)
- Misselijkheid
- Asthenie (verlies van energie)
- Perifeer oedeem (opzwellen van de enkels, voeten of vingers)
- Toename van lichaamsgewicht
- Erectiestoornissen (onvermogen om een erectie te krijgen of te houden)
- Verstopte neus

Vaak: komen voor bij maximaal 1 op 10 patiënten
- Te lage bloeddruk (voornamelijk bij het opstaan vanuit een liggende positie)
- Sinusitis (ontsteking van het slijmvlies van uw sinussen)
- Zenuwachtigheid
- Verstopte neus
- Licht gevoel in het hoofd of flauwvallen
- Lopende neus
- Kortademigheid
- Gebrek aan seksueel verlangen
- Aanhoudende en pijnlijke erectie

Zelden: komen voor bij maximaal 1 op 1.000 patiënten
- Lage bloeddruk (hypotensie)
- Draaiduizeligheid (vertigo)
- Uitslag
- Nekpijn
- Schouderpijn
- Spierzwakte
- Rugpijn
- Artritis (pijn en ontsteking in de gewrichten) of jicht (ophoping van urinezuur in uw gewrichten, wat pijn veroorzaakt)
- Infectie in de luchtwegen van uw longen (bronchitis)

- Gewrichtspijn
- Jeuk (pruritus)
- Troebel of verslechterd zicht
- Onbedoeld urineverlies
- Urineweginfectie
- Hoesten
- Keelpijn
- Zwelling en irritatie aan de binnenkant van de neus
- Oorsuizen (tinnitus)
- Ontsteking van de achterkant van de keel
- Gevoel van duizeligheid of flauwvallen
- Onregelmatige en snelle hartslag
- Ooginfectie
- Pijn op de borst
- Buikpijn
- Griepachtige symptomen
- Koorts
- Gezichtsoedeem (ophoping van vocht in het gezicht)
- Vermindering van het aantal bloedplaatjes, wat het risico op bloedingen of kneuzingen verhoogt
- Kriebelig gevoel, jeuk of tintelen zonder oorzaak (paresthesie)

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
- Lui oog
- Posturale hypotensie (een plotse afname van de bloeddruk bij het te snel opstaan wat duizeligheid veroorzaakt)
- Constipatie (moeilijke ontlasting)
- Diarree (frequente lopende ontlasting)
- Duizeligheid (gevoel van evenwichtsverlies)
- Depressie

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking.
Voor dit geneesmiddel is geen speciale bewaartemperatuur vereist.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is terazosinehydrochloride.

Hytrin 2 bevat terazosinehydrochloride overeenkomend met 2 mg terazosine per tablet.
Hytrin 5 bevat terazosinehydrochloride overeenkomend met 5 mg terazosine per tablet.
Hytrin 10 mg bevat terazosinehydrochloride overeenkomend met 10 mg terazosine per tablet.

- De andere stoffen in dit medicijn zijn lactose, maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel, talk en magnesiumstearaat.

De 2 mg tabletten bevatten naast de genoemde stoffen ook chinolinegeel (E104), aluminiumlak. De 5 mg tabletten bevatten ook ijzeroxide (E172). De 10 mg tabletten bevatten ook indigotine (E132), aluminiumlak.

Hoe ziet Hytrin eruit en wat zit er in een verpakking?
Hytrin 2 is een gele tablet. Hytrin 5 is een bruine tablet. Hytrin 10 is een blauwe tablet.

Hytrin 2, Hytrin 5 en Hytrin 10 zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen van 28 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Amdipharm Limited
Unit 17
Northwood House
Northwood Crescent
Northwood
Dublin 9
D09 V504
Ierland

Fabrikant

Famar Italia S.P.A.
Via Zambeletti, 25 – 20021
Baranzate, Milaan
Italië

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen
RVG 14559 (Hytrin 2)
RVG 14560 (Hytrin 5)
RVG 14561 (Hytrin 10)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2026.