

---

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT****Vidisc Carbogel E.D.O. 2 mg/g ooggel**  
carbomeer

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Vidisc Carbogel E.D.O. en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

**1. WAT IS VIDISIC CARBOGEL E.D.O. EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT**

Vidisc Carbogel E.D.O. is een steriele ooggel voor oogheelkundig gebruik. Vidisc Carbogel E.D.O. heeft bevochtigende eigenschappen en wordt door uw arts voorgeschreven om verschijnselen van de droge ogen te behandelen:

- bij verminderde traanproductie
- bij het syndroom van Sjögren (ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken)
- wanneer het oog niet gesloten kan worden door beschadiging van de oogleden of door zenuwverlammingen

**2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?****Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

**Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer de irritatie van het droge oog aanhoudt of verergert. In dat geval moet het gebruik van Vidisc Carbogel worden gestopt en moet contact worden opgenomen met de arts.

**Kinderen en adolescenten tot 18 jaar**

De veiligheid en werkzaamheid van Vidisc Carbogel E.D.O. bij kinderen en adolescenten in de dosering aanbevolen bij volwassenen is vastgesteld op basis van klinische ervaring. Er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

**Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Als u ook andere oogdruppels gebruikt, is het aan te raden om na het indruppelen van de andere druppels, 15 minuten te wachten met het aanbrengen van Vidisc Carbogel.

Gebruikt u naast Vidisic Carbogel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

### Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.



### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Na inbrengen van de ooggel kan wazig zien vóórkomen waardoor het gezichtsvermogen gedurende korte tijd verminderd is. Als u last heeft van wazig zien, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

## 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is: breng 1 druppel in het te behandelen oog aan al naar gelang de behoefte:



De één-dosis-ophtiole is bedoeld voor **eenmalig** gebruik. Na aanbreken mag deze niet worden bewaard.

In geval u bemerkt dat Vidisic Carbogel E.D.O. te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### Kinderen en adolescenten tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid van Vidisic Carbogel E.D.O. bij kinderen en adolescenten in de dosering aanbevolen bij volwassenen is vastgesteld op basis van klinische ervaring. Er zijn echter geen data uit klinische studies beschikbaar.

**Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Er zijn geen nadelige effecten bekend na toediening van teveel Vidisic Carbogel E.D.O. Als u teveel druppels Vidisic Carbogel E.D.O. heeft gebruikt en er treden toch bijwerkingen op, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Uw klachten kunnen terugkeren of verergeren. Onderbreek nooit het gebruik ervan zonder overleg met arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

### *Oogaandoeningen*

- *Soms* (bij meer dan 1 op de 1.000 personen maar bij minder dan 1 op de 100): wazig zien, branderigheid.  
Dit zijn milde bijwerkingen van Vidisic Carbogel E.D.O., die meestal na korte tijd vanzelf verdwijnen.
- *Zelden* (bij meer dan 1 op de 10.000 personen maar bij minder dan 1 op de 1.000): plaatselijke overgevoeligheidsreacties.

In zeer zeldzame gevallen hebben sommige patiënten met ernstige schade aan de heldere laag op de voorzijde van het oog (het hoornvlies) ondoorzichtige vlekken op het hoornvlies ontwikkeld, door een accumulatie van calcium tijdens de behandeling.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

**Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is carbomeer. 1 g ooggel bevat 2 mg carbomeer.
- De andere stoffen in dit middel zijn natriumhydroxide (E524), sorbitol (E420), dinatriumfosfaat dodecahydraat (E339) en water voor injecties.

Bevat geen conserveermiddel.

**Hoe ziet Vidisic Carbogel E.D.O. er uit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Vidisic Carbogel E.D.O gel is een heldere kleurloze gel.

Vidisic Carbogel E.D.O. is verpakt in een omverpakking met 60 Één-Dosis-Ophthioles.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Ierland

**Fabrikant**

Dr. Gerhard Mann Chem-Pharm Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlijn

Duitsland

**Inschrijving in het Register**

Vidisic Carbogel E.D.O. is in het register ingeschreven onder RVG 29773.

UR

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2023.**