

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

FUROSEMIDE 20 mg TABLETTEN

FUROSEMIDE 40 mg TABLETTEN

(Furosemide)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u oorgescreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde symptomen als u.
- Als u last krijgt van bijwerkingen, praat er dan over met uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wat u moet weten alvorens Furosemide-tabletten in te nemen
3. Hoe neemt u Furosemide-tabletten in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Furosemide-tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat zijn Furosemide-tabletten en waarvoor worden ze gebruikt?

Furosemide behoort tot de groep geneesmiddelen die diuretica worden genoemd, die de hoeveelheid urine die door de nieren wordt afgegeven doen toenemen, waardoor overtollige vloeistoffen het lichaam verlaten. Diuretica worden ook wel ‘plaspillen’ genoemd.

Furosemide Tabletten worden alleen of in combinatie met andere middelen tegen hoge bloeddruk gebruikt bij de behandeling van oedeem (overmatige ophoping van vocht) veroorzaakt door hart-, nier- of leveraandoeningen. De tabletten kunnen ook worden gebruikt om longoedeem (ophoping van vocht in de longen) en milde tot matige hypertensie (hoge bloeddruk) te behandelen.

2. Wat u moet weten alvorens Furosemide-tabletten in te nemen

Neem geen Furosemide-tabletten indien:

- U allergisch (overgevoelig) bent voor Furosemide of één van de andere ingrediënten van de tabletten (deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6). Tekenen van een allergische reactie omvatten: uitslag, problemen met slikken of ademen, gezwollen lippen, gezicht, keel of tong.
- U allergisch bent voor amiloride, sulfonamiden of middelen die daarvan zijn afgeleid, zoals sulfadiazine of co-trimoxazol.

- Men u verteld heeft dat u weinig bloed of vocht in uw lichaam hebt, of uitgedroogd bent (met of zonder een lage bloeddruk in combinatie daarmee)
- De arts u heeft verteld dat u lijdt aan nierfalen. Bij bepaalde types nierfalen mag u dit geneesmiddel wel nog innemen. Uw arts zal daarover kunnen beslissen.
- U ernstige leverproblemen hebt (cirrose)
- U een zouttekort (elektrolytentekort) hebt (bijvoorbeeld te weinig kalium of natrium in uw bloed, zoals gebleken is uit een bloedonderzoek)
- U niet kunt plassen
- U een ziekte hebt genaamd “de ziekte van Addison”. Deze kan u moe en zwak maken
- U andere geneesmiddelen inneemt die het kaliumgehalte in uw bloed aanpassen (zie andere geneesmiddelen en Furosemide-tabletten”
- U een kind of jongere onder de 18 bent. Furosemide-tabletten zijn niet geschikt voor kinderen.
- U borstvoeding geeft (zie ‘Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid” hieronder)

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker alvorens Furosemide-tabletten in te nemen indien:

- U een lage bloeddruk hebt, uw vocht-elektrolytenbalans moet dan regelmatig worden gecontroleerd en de dosis moet daarop worden aangepast, of als u zich duizelig voelt bij het rechtstaan
- U diabetes hebt (te hoge bloedsuikerwaarden)
- U 65 jaar of ouder bent
- U problemen hebt met plassen (urine)
- U jicht hebt
- U lever- of nierproblemen hebt
- U weinig eiwitten in uw bloed hebt (hypoproteïnemie)
- U lijdt aan symptomen van acute porfyrie met inbegrip van ernstige pijn in maag, rug of dijen, misselijkheid, braken of constipatie evenals een zwak gevoel in armen en benen
- U een bejaarde patiënt met dementie bent en ook risperidon inneemt
- U prostaatproblemen hebt
- U zich duizelig of uitgedroogd voelt. Dat kan gebeuren als u veel vocht hebt verloren door ziekte, diarree of vaak plassen. Het kan ook gebeuren als u problemen ondervindt met drinken of eten.
- U een glucosetest moet ondergaan
- U andere plasmiddelen inneemt
- U dit geneesmiddel aan een baby geeft die te vroeg geboren is.

Als u ouder bent, als u andere medicatie gebruikt die tot een daling van de bloeddruk kan leiden, en als u andere medische aandoeningen hebt waardoor u risico loopt op een daling in de bloeddruk.

Als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is, contacteer dan uw arts of apotheker alvorens Furosemide-tabletten in te nemen.

Andere geneesmiddelen en Furosemide-tabletten

Vertel het uw arts of apotheker als u nog andere geneesmiddelen neemt of dat kort geleden gedaan hebt of in de nabij toekomst gaat doen.

Furosemide-tabletten kunnen immers de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Er zijn ook bepaalde geneesmiddelen die de manier waarop de Furosemide-tabletten werken aantasten.

Gebruik dit geneesmiddel niet en vertel het uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen veranderen. Dit zijn onder andere kaliumsupplementen zoals kaliumchloride, of bepaalde plasmiddelen (diuretica) zoals triamteren.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Furosemide-tabletten aantasten en de kans op bijwerkingen vergroten:

- Geneesmiddelen zoals ramipril, enalapril, perindopril (ACE-remmers genoemd) of losartan, candesartan, irbesartan (ook “angiotensine II receptorantagonisten” genoemd). Het kan zijn dat uw arts de dosis van uw tabletten moet aanpassen of u zal vragen ze niet langer in te nemen.
- Geneesmiddelen voor hoge bloeddruk of hartproblemen. Het kan zijn dat uw arts de dosis van uw geneesmiddel moet aanpassen.
- Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen, die alfablokkers worden genoemd, zoals prazosine.
- Andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk en andere geneesmiddelen om water uit uw lichaam te verwijderen, zogenaamde diuretica, zoals amiloride, spironolacton, acetazolamide en metolazon.
- Geneesmiddelen voor de behandeling van onregelmatige hartslag, zoals amiodaron, disopyramide, flecaïnide, lidocaïne, sotalol en mexiletine.
- Geneesmiddelen die u helpen om te slapen en te ontspannen zoals chloorhydraat
- Geneesmiddelen die als algemene verdoving worden gebruikt om uw spieren tijdens de operatie te ontspannen. Als u verdoofd moet worden, zorg er dan voor dat uw arts of verpleegkundige weet dat u furosemide neemt.
- Geneesmiddelen voor diabetes. Deze werken niet even goed in combinatie met Furosemide-tabletten.
- Theofylline – gebruikt voor een piepende of moeilijke ademhaling
- Fenytoïne – gebruikt voor epilepsie. Dat kan het effect van Furosemide-tabletten verlagen.
- Geneesmiddelen voor de behandeling van psychische aandoeningen die 'psychoses' worden genoemd, zoals risperidon, amisulpride, sertindol, pimozide en chloorpromazine. Vermijd het gebruik van pimozide tegelijkertijd met furosemide.

De volgende geneesmiddelen kunnen de kans op bijwerkingen vergroten in combinatie met Furosemide-tabletten:

- Lithium: gebruikt voor psychische aandoeningen. Om de bijwerkingen te helpen terugdringen kan uw arts de dosis lithium moeten aanpassen en de lithiumspiegel in uw bloed moeten controleren.
- Platinaverbindingen /Cisplatine: gebruikt voor bepaalde types kanker
- Digoxine: gebruikt voor hartproblemen. Uw arts kan de dosis van uw geneesmiddel moeten veranderen.
- Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID's): gebruikt voor pijn en ontstekingen zoals aspirine, ibuprofen, ketoprofen of indometacine.
- Carbamazepine: gebruikt voor epilepsie
- Aminoglutethimide: gebruikt voor borstkanker
- Ciclosporine, tacrolimus, aldesleukine: gebruikt om de afstoting van organen na een transplantatie tegen te gaan
- Moxisylyte: gebruikt voor de behandeling van het syndroom van Raynaud
- Geneesmiddelen voor de behandeling van angina, die u onder de tong sprayt of oplost, zoals glyceryltrinitraat of isosorbidedinitraat
- Methotrexaat: gebruikt voor huidkanker, gewrichts- of darmaandoeningen
- Carbenoxolon en scuralfaat: gebruikt voor zweren in de slokdarm
- Reboxetine, amitriptyline en fenelzine: gebruikt voor depressie
- Amfotericine: gebruikt voor schimmelinfecties indien langdurig gebruikt
- Corticosteroïden: gebruikt voor ontstekingen, zoals prednisolone
- Atomoxetine: gebruikt voor de behandeling van ADHD (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis)
- Geneesmiddelen om de spieren te ontspannen, zoals baclofen en tizanidine
- Middelen tegen allergieën (antihistaminen), voor de behandeling van allergieën, zoals cetirizine.
- Alprostadil, gebruikt voor de behandeling van impotentie bij mannen
- Oestrogeen en drospirenon, gebruikt als voorbehoedsmiddelen of bij hormoonvervangings therapie (HRT)
- Zoethout: vaak gebruikt in hoestgeneesmiddelen, indien in grote hoeveelheden gebruikt
- Probenecide (gebruikt met andere HIV-geneesmiddelen)
- Geneesmiddelen voor infecties zoals gentamicine, amikacine, neomycine, netilmicine, tobramycine, vancomycine of hoge doses cefalosporines
- Geneesmiddelen gebruikt als injecties voorafgaand aan röntgenonderzoek (radiocontrastmiddel)
- Geneesmiddelen gebruikt voor constipatie (laxeermiddelen) bij langdurig gebruik, zoals bisacodyl of senna
- Geneesmiddelen voor astma in hoge doses zoals salbutamol, terbutalinesulfaat, salmeterol, formoterol of bambuterol
- Geneesmiddelen voor een verstopte neus, zoals efedrine en xylometazoline
- Kaliumzouten voor de behandeling van een laag kaliumgehalte in uw bloed
- Geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, zoals levodopa
- Andere plasmiddelen (diurectica) zoals bendroflumethiazide. Uw arts kan de dosis van uw geneesmiddel moeten aanpassen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U moet alcohol vermijden terwijl u met Furosemide-tabletten wordt behandeld, omdat daardoor uw bloeddruk nog verder kan dalen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

- Neem **geen** Furosemide-tabletten als u zwanger bent. Praat met uw arts alvorens dit middel te nemen als u zwanger bent, zwanger zou kunnen worden of denkt zwanger te zijn. Geef geen borstvoeding als u Furosemide-tabletten neemt. Dat is omdat kleine hoeveelheden doorgegeven worden via de moedermelk. Praat erover met uw arts alvorens dit middel te nemen als u borstvoeding geeft of dat van plan bent te doen.

Vraag uw arts of apotheker om advies alvorens geneesmiddelen in te nemen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door dit geneesmiddel kunt u zich duizelig of onwel gaan voelen. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap als dat gebeurt.

Furosemide-tabletten bevatten lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u intolerant bent voor bepaalde suikers (bijvoorbeeld lactose), contacteer dan uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

3. Hoe neemt u Furosemide tabletten in?

- Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.
- Het aantal tabletten hangt af van uw gesteldheid. De tabletten moeten op zijn geheel met een glas water ingenomen worden.
- Neem de tabletten steeds op ongeveer hetzelfde moment voor de maaltijd of volgens de voorschriften van uw arts.

Volwassenen en ouderen:

De gebruikelijke dosis is een of twee tabletten 's ochtends. Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u moet innemen.

Kinderen en jongeren (onder de 18):

Niet aanbevolen daar de veiligheid nog niet werd vastgesteld bij deze leeftijdsgroep.

Als u sucralfaat neemt (een geneesmiddel tegen maagzweren). Neem geen sucralfaat tegelijkertijd met de Furosemide-tabletten in. Neem uw dosis minstens 2 uur voor of na de Furosemide-tabletten. Dat kan immers een invloed hebben op de manier waarop uw geneesmiddel werkt.

Als u te veel Furosemide-tabletten hebt ingenomen

Als u, een kind, of iemand anders te veel tabletten heeft ingenomen, waarschuw dan onmiddellijk uw arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis, zelfs als er geen teken

van ongemak zijn. Neem het geneesmiddel in zijn originele verpakking mee zodat de arts snel uw medicatie kan identificeren. Als u te veel Furosemide-tabletten inneemt, kunt u zich verward voelen, niet kunnen focussen, een gebrek aan emotie of belangstelling vertonen. U kunt ook last krijgen van duizeligheid, een licht gevoel in uw hoofd, flauwvallen (door lage bloeddruk), een onregelmatige hartslag, spierzwakte of krampen en bloedklonters (tekenen daarvan omvatten pijn en opzwellen in het aangetaste lichaamsdeel). U kunt ook problemen ondervinden met uw nieren of bloed..

Als u vergeet Furosemide-tabletten in te nemen

Neem de dosis in zodra u eraan denkt, tenzij het avond is. Als u de gemiste dosis 's avonds toch inneemt, kan het zijn dat u er 's nachts uit moet om te plassen. Neem uw volgende dosis op het gewone tijdstip.

NEEM GEEN DUBBELE DOSIS OM EEN VERGETEN DOSIS IN TE HALEN.

Als u stopt met het gebruik van Furosemide-tabletten

Blijf uw Furosemide-tabletten innemen tot uw arts zegt dat u ermee moet stoppen.

Bloedonderzoeken

Uw arts kan bloedonderzoeken uitvoeren om na te gaan of het gehalte van bepaalde zouten in het bloed correct is.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kunnen ook Furosemide-tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

STOP MET HET INNEMEN van dit geneesmiddel en contacteer onmiddellijk uw arts als u een van onderstaande bijwerkingen ervaart:

- allergische reacties, met mogelijk huiduitslag met ernstige jeuk en netelroos, koorts, lichtgevoeligheid, ernstige allergische reacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijn en/of ontsteking van de ogen, ernstige, acute (allergische) reactie die gepaard gaat met koorts en blaren op de huid/afbladderende huid en kleine onderhuidse bloedingen.
- plotse ontsteking van de alvleesklier gepaard met ernstige pijn in de bovenstreek van de onderbuik, die naar achteren doorstraalt.

De andere mogelijke bijwerkingen worden ingedeeld volgens frequentie, aan de hand van de volgende categorieën:

- Vaak (1 tot 10 gebruikers op 100)
- Soms (1 tot 10 gebruikers op 1.000)

- Zelden (1 tot 10 gebruikers op 10.000)
- Zeer zelden (minder dan 1 gebruiker op 10.000)

Vaak

Furosemide kan zorgen dat er te veel lichaamsvocht wordt afgedreven (bijv. vaker plassen dan normaal) en te veel mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium). De mogelijke symptomen zijn dorst, hoofdpijn, verwarring, spierkrampen, grotere gevoeligheid van de spieren, spierzwakte, hartritmestoornissen en problemen in het maag-darmstelsel zoals een gevoel van ongemak in de maag met de neiging tot braken, of diarree.

Als u een tekort hebt aan natrium (natriumdeficiëntie):

- Kramp in de kuitspieren
- Verminderde eetlust
- Lusteloosheid
- Zwak gevoel
- Duizeligheid
- Lichthoofdigheid
- Verwarring

Als u een tekort hebt aan kalium (kaliumdeficiëntie):

- Spierzwakte en het onvermogen om één of meerdere spieren samen te trekken (paralysie)
- Grotere uitdrijving van urine
- Hartproblemen
- Bij ernstige kaliumdeficiëntie: verstoring van de werking van de ingewanden of verwarring, wat kan leiden tot coma

Als u een tekort hebt aan magnesium en calcium (magnesium- en calciumdeficiëntie):

- Grotere gevoeligheid van de spieren
- Hartritmestoornissen
- Lagere bloeddruk, wat leidt tot verminderde concentratie en reacties, lichthoofdigheid, een gevoel van druk in het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, een gevoel van zwakte, visuele stoornissen, een droge mond en het onvermogen recht te staan

Soms

- Abnormaal bloedgehalte samen met kneuzingen en de neiging te bloeden
- Lichtgevoeligheid (fotosensitiviteit)
- Ongewenst urineverlies
- Bij bejaarden kan dit leiden tot een laag bloedvolume, vloeistofdepletie en verdikking van het bloed. Er kunnen zich zo klonters in het bloed vormen.
- doofheid (soms onomkeerbaar)

Zelden

- Abnormale bloedgehalten (tekort aan witte bloedcellen) samen met een grotere infectiegevoeligheid
- Stijging in bepaalde stoffen (eosinofiele cellen) in het bloed

- Een kruipend gevoel op de huid, jeuken of tintelen zonder reden
- Een levensbedreigende vorm van bewusteloosheid
- Hoorproblemen & oorsuizingen. Deze aandoeningen zijn meestal tijdelijk van aard.
- Ontsteking van een bloedvat
- Acut nierfalen
- Ontsteking van de nieren in combinatie met bloed in de urine, koorts en pijn in de lendenen. Als u een obstructie hebt van de urinewegen, kan er zich een grotere urineproductie voordoen of deze kan slechter worden.
- Als u een blaasaandoening hebt, een groter prostaat of een versmalling van de urineleiders kan de urineproductie plots stoppen
- Shock (ernstige daling in de bloeddruk, extreme bleekheid, rusteloosheid, zwakke snelle pols, klamme huid, verstoord bewustzijn) als gevolg van een plotse ernstige uitzetting van de bloedvaten door een allergie voor bepaalde stoffen)
- Koorts
- Kleinere mentale stoornissen

Zeer zelden

- Bloedarmoede (een aandoening gekenmerkt door een tekort aan rode bloedcellen)
- Zeer ernstige bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedcellen) gepaard met een plotse hoge koorts, ernstige keelpijn en zweren in de mond
- Bepaalde storingen van de leverfunctie
- Stijging in bepaalde leverenzymen

Tijdens de behandeling met furosemide kunnen de bloedwaarden van sommige vetten (cholesterol en trygliceriden) stijgen, maar deze worden normaal gesproken binnen 6 maanden weer normaal.

niet bekend:

- acute gegeneraliseerde exantheemateuze pustulose (AGEP) (acute huiduitslag)
- Duizeligheid, flauwvallen en verlies van bewustzijn (veroorzaakt door symptomatische hypotensie)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe Furosemide tabletten bewaren?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Doosjes en blisterverpakkingen: Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking en deze goed gesloten houden.
- Gebruik de Furosemide-tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. De

- vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
- Gooi geen geneesmiddelen weg via het afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker om geneesmiddelen die u niet meer gebruikt weg te gooien. Deze maatregelen zullen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Furosemide-tabletten?

- De werkzame stof in dit middel is furosemide. Dat is de nieuwe naam van frusemide. Het ingrediënt zelf is niet veranderd.
- De tabletten zijn verkrijgbaar in twee sterkten, 20 mg en 40 mg. Elke tablet bevat 20 of 40 mg van de werkzame stof.
- De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, gepregelatineerd maïszetmeel, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

Hoe zien Furosemide 20 mg en Furosemide 40 mg tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

- De tabletten van 20 mg zijn ronde tabletten, wit tot gebroken wit, met 'F 20' aan de ene zijde en 'BL' aan de andere zijde.
- De tabletten van 40 mg zijn ronde tabletten, wit tot gebroken wit, met 'F 40' en een breukstreep aan de ene zijde en 'BL' aan de andere zijde.
- De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen met 28, 30, 50, 56,84,90, 98 en 100 tabletten en houders met 100, 250, 500 en 1000 tabletten.
- Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Brillpharma (Ireland) Limited, Inniscarra, Main Street, Rathcoole, Co. Dublin, Ierland

Fabrikant:

Bristol Laboratories Limited, Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 1EG, Verenigd Koninkrijk

Bristol Laboratories Limited, Laporte Way, Luton, LU4 8WL, Verenigd Koninkrijk.

axcount Generika GmbH, Max-Planck-Straße 36d, 61381 Friedrichsdorf, Duitsland

Bristol Laboratories Limited, Unit 5, Traynor Way, Whitehouse Business Park, Peterlee, SR8 2RU, Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder RVG 32462 (20 mg)/RVG 32463 (40 mg)

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Ierland	Furosemide Bristol 20 mg Tablets
	Furosemide Bristol 40 mg Tablets
VK	Furosemide 20 mg Tablets
	Furosemide 40 mg Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2022