

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

### Mucodyne® Junior 20mg/ml hoestdrank (Carbocisteïne)

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.**

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### **In deze bijsluiter:**

1. Wat is Mucodyne® Junior en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Mucodyne® Junior inneemt
3. Hoe wordt Mucodyne® Junior ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Mucodyne® Junior?
6. Aanvullende informatie

#### **1. WAT IS MUCODYNE® JUNIOR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?**

Het middel kan vastzittend slijm in de luchtwegen dunner maken, zodat het gemakkelijker kan worden opgehoest.

#### **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U MUCODYNE® JUNIOR INNEEMT**

##### **Neem Mucodyne® Junior niet in**

- als u of uw kind allergisch (overgevoelig) is voor Carbocisteïne of voor één van de andere bestanddelen van Mucodyne® Junior.
- als uw kind jonger is dan 2 jaar.

##### **Wees extra voorzichtig met Mucodyne® Junior**

- als u of uw kind een maag – of darmzweer heeft, of hiervan een voorgeschiedenis heeft
- wanneer uw kind suikerziekte heeft, dient er rekening gehouden te worden met het glucosegehalte van de drank: 125 mg per dosis van 5ml; 250 mg per dosis van 10ml en 375 mg per dosis van 15ml.

##### **Inname in combinatie met andere geneesmiddelen**

Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

*Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.*

##### **Zwangerschap en borstvoeding**

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

## **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing.

**Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mucodyne® Junior** Mucodyne® Junior bevat gehydrogeneerde glucosestroop. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

### **3. HOE WORDT MUCODYNE® JUNIOR INGENOMEN?**

*Volg bij inname van Mucodyne® Junior nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.*

Drank 20 mg/ml

<b>Kinderen:</b>	3-5 jaar	3-4 maal daags 5ml
	5-12 jaar	3-4 maal daags 10ml
	12 jaar en ouder	3-4 maal daags 15ml

NB: 15 ml komt overeen met één eetlepel

Mucodyne® Junior niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.

De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld voor kinderen van 2 tot 3 jaar.

#### **Wat u moet doen als u meer van Mucodyne® Junior heeft ingenomen dan u zou mogen**

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts.

#### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Mucodyne® Junior in te nemen**

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk de vergeten dosis in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis Mucodyne® Junior in om zo de vergeten dosis in te halen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Mucodyne® Junior bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

#### **Maagdarmstelselaandoeningen**

In sommige gevallen kunnen zich maagklachten voordoen. Er zijn mogelijkheden van maagkramp, misselijkheid en diarree.

#### **Huid- en onderhuidaandoeningen**

Netelroos

#### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nederlands bijwerkingen centrum lareb, website [www.Lareb.nl](http://www.Lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. HOE BEWAART U MUCODYNE® JUNIOR?**

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op de verpakking van vouwdoos en etiket achter “Niet te gebruiken na”.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Mucodyne® Junior?**

- Het werkzame bestanddeel is Carbocisteïne.
- De andere bestanddelen zijn natriumhydroxide (E524), hydroxyethylcellulose, natriumsaccharine (E954), gehydrogeneerde glucosestroop (lycaine) (E965), natriummethylhydroxybenzoaat (E219), kersen/frambozen smaakstof, gezuiverd water, cochenille rood A (E124).

## **Hoe ziet Mucodyne® Junior er uit en de inhoud van de verpakking?**

Flacon met 125 ml drank à 20 mg/ml.

### **Registratiehouder**

Vemedia Manufacturing BV  
Verrijn Stuartweg 60  
1112 AX Diemen

### **Fabrikant**

Delpharm Bladel B.V.  
Industrieweg 1  
5531 AD Bladel

**In het register ingeschreven onder RVG 34899.**

**Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2019.**