

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 1**

## **1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL**

Teriparatide Teva 20 microgram/80 microliter, oplossing voor injectie in voorgevulde pen

## **2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING**

Elke dosis van 80 microliter bevat 20 microgram teriparatide\*.

Eén voorgevulde pen van 2,4 ml bevat 600 microgram teriparatide (overeenkomend met 250 microgram per ml).

\*Teriparatide (1-34) is identiek aan de uit 34 aminozuren bestaande N-terminale aminozuursequentie van endogeen humaan parathyreoïd hormoon.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

## **3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie (injectie)

Kleurloze, heldere oplossing

## **4. KLINISCHE GEGEVENS**

### **4.1 Therapeutische indicaties**

Teriparatide Teva is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen.

Behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen en bij mannen met een verhoogd risico op botbreuken (zie rubriek 5.1). Bij postmenopauzale vrouwen is er een significante afname aangetoond in de incidentie van vertebrale en niet-vertebrale fracturen, maar niet van heupfracturen.

Behandeling van osteoporose geassocieerd met aanhoudende systemische glucocorticoïde behandeling bij vrouwen en mannen met een verhoogd risico op fracturen (zie rubriek 5.1).

### **4.2 Dosering en wijze van toediening**

#### **Dosering**

De aanbevolen dosering Teriparatide Teva is 20 microgram eenmaal daags.

De maximale totale behandelduur met Teriparatide Teva moet 24 maanden zijn (zie rubriek 4.4). Het 24 maanden durend behandelingsschema met Teriparatide Teva dient gedurende het gehele leven van een patiënt niet herhaald te worden.

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 2**

Patiënten moeten aanvullend calcium- en vitamine-D-supplementen gebruiken als de inname met de voeding ontoereikend is.

Na afloop van de behandeling met teriparatide mogen de patiënten doorgaan met een andere behandeling voor osteoporose.

### **Speciale patiëntgroepen**

#### *Patiënten met nierinsufficiëntie*

Teriparatide mag niet worden toegepast bij patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie (zie rubriek 4.3). Bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie moet teriparatide met voorzichtigheid worden toegepast. Er is geen speciale voorzorg vereist voor patiënten met een lichte nierinsufficiëntie.

#### *Patiënten met leverinsufficiëntie*

Er zijn geen gegevens beschikbaar over patiënten met een leverinsufficiëntie (zie rubriek 5.3). Teriparatide dient daarom met voorzichtigheid te worden toegepast.

#### *Pediatrische patiënten en adolescenten met open epifysen:*

De veiligheid en werkzaamheid van teriparatide bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Teriparatide mag niet worden gebruikt bij pediatrische patiënten of adolescenten (tot 18 jaar) met open epifysen.

#### *Oudere patiënten*

Aanpassing van de dosering gebaseerd op leeftijd is niet noodzakelijk (zie rubriek 5.2).

### **Wijze van toediening**

Teriparatide dient eenmaal daags te worden toegediend door middel van subcutane injectie in het dijbeen of de buik.

Patiënten moet worden aangeleerd de juiste injectietechnieken toe te passen (zie rubriek 6.6). Er is ook een gebruikershandleiding verkrijgbaar om de patiënten te instrueren omtrent het juiste gebruik van de pen.

### **4.3 Contra-indicaties**

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen
- Zwangerschap en borstvoeding (zie rubrieken 4.4 en 4.6)
- Reeds bestaande hypercalciëmie
- Ernstige nierinsufficiëntie
- Metabole botziekten (met inbegrip van hyperparathyreoïdie en botziekte van Paget) anders dan primaire osteoporose of door glucocorticosteroïde geïnduceerde osteoporose
- Onverklaarde verhoogde alkalische fosfatase
- Voorafgaande radiotherapie met externe stralingsbundels of implantaat-radiotherapie van het

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 3**

- skelet
- Patiënten met een maligniteit van het skelet of botmetastasen moeten worden uitgesloten van behandeling met teriparatide.

#### **4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik**

##### ***Calcium in serum en urine***

Bij patiënten met een normale calciumspiegel zijn na injectie van teriparatide lichte en voorbijgaande verhogingen van de serumcalciumconcentratie waargenomen. De serumcalciumconcentraties bereiken na elke dosis teriparatide na 4 tot 6 uur een maximumwaarde en zijn na 16 tot 24 uur weer tot de uitgangswaarde gedaald. Als bij een patiënt bloedmonsters moeten worden afgenomen om het serumcalcium te meten, dan moet dat daarom ten minste 16 uur na de meest recente Teriparatide Teva-injectie worden gedaan. Routinematig onderzoek van de calciumspiegel tijdens de behandeling is niet noodzakelijk.

Teriparatide Teva kan kleine stijgingen van calciumuitscheiding in de urine veroorzaken, maar in de klinische onderzoeken verschilde de incidentie van hypercalciurie niet van die van met placebo behandelde patiënten.

##### ***Urolithiasis***

Teriparatide Teva is niet onderzocht bij patiënten met actieve urolithiasis. Teriparatide Teva moet bij patiënten met actieve of recente urolithiasis met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt vanwege de mogelijkheid om deze conditie te verslechteren.

##### ***Orthostatische hypotensie***

In klinische kortetermijnonderzoeken met teriparatide zijn geïsoleerde episoden van voorbijgaande orthostatische hypotensie waargenomen. Een dergelijke gebeurtenis begon gewoonlijk binnen 4 uur na toediening en verdween spontaan binnen enkele minuten tot enkele uren. Wanneer zich voorbijgaande orthostatische hypotensie voordeed, trad dit binnen de eerste paar doses op, werd dit verlicht door de proefpersonen in een achteroverliggende houding te brengen en sloot dit voortzetting van de behandeling niet uit.

##### ***Nierinsufficiëntie***

Bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie moet de nodige voorzichtigheid worden betracht.

##### ***Adolescente patiëntgroep***

Ervaring met de adolescente patiëntgroep, inclusief pre-menopauzale vrouwen, is beperkt (zie rubriek 5.1). Behandeling dient alleen gestart te worden indien de voordelen duidelijk opwegen tegen de risico's in deze populatie.

Vrouwen die mogelijk zwanger kunnen worden, dienen een betrouwbare anticonceptie methode te gebruiken tijdens het gebruik van Teriparatide Teva. Indien zwangerschap optreedt, dient Teriparatide Teva te worden gediscontinueerd.

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 4**

### ***Duur van de behandeling***

Onderzoeken bij ratten duiden op een verhoogde incidentie van osteosarcoom bij langdurige toediening van teriparatide (zie rubriek 5.3). Totdat nadere klinische gegevens beschikbaar komen, mag de aanbevolen behandelduur van 24 maanden niet worden overschreden.

### **Belangrijke informatie over een ingrediënt van Teriparatide Teva:**

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium, per dosis, d.w.z. is in wezen 'natriumvrij'.

## **4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

In een onderzoek waarin 15 gezonde proefpersonen dagelijks digoxine kregen toegediend tot "steady state" werd bereikt, veranderde een enkelvoudige dosis teriparatide niets aan het cardiale effect van digoxine. Sporadische casuïstische meldingen duiden er echter op dat hypercalciëmie patiënten kan predisponeren voor digitalisvergiftiging. Omdat door teriparatide het serumcalcium tijdelijk stijgt, moet teriparatide met de nodige voorzichtigheid worden toegepast bij patiënten die digitalis gebruiken.

Teriparatide is beoordeeld in farmacodynamische interactie onderzoeken met hydrochloorthiazide. Er werden geen klinisch significante interacties waargenomen.

Gelijktijdige toediening van raloxifene of hormoon suppletie therapie met teriparatide had geen invloed op de effecten van teriparatide op de hoeveelheid calcium in serum of urine, of op klinische bijwerkingen.

## **4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

### ***Vrouwen die zwanger kunnen worden/anticonceptie bij vrouwen***

Vrouwen die zwanger kunnen worden, dienen een effectieve anticonceptiemethode te gebruiken tijdens het gebruik van Teriparatide Teva. Indien zwangerschap optreedt, dient Teriparatide Teva te worden gediscontinueerd.

### ***Zwangerschap***

Teriparatide Teva is gecontra-indiceerd voor gebruik tijdens de zwangerschap (zie rubriek 4.3).

### ***Borstvoeding***

Teriparatide Teva is gecontra-indiceerd voor gebruik tijdens borstvoeding. Het is niet bekend of teriparatide in de moedermelk wordt uitgescheiden.

### ***Vruchtbaarheid***

Uit onderzoeken bij konijnen is reproductietoxiciteit gebleken (zie rubriek 5.3). Het effect van teriparatide op humane foetale ontwikkeling is niet onderzocht. Het potentiële risico voor mensen is onbekend.

## **4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen**

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
oplossing voor injectie in voorgevulde pen

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 5**

Teriparatide heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Bij enkele patiënten is voorbijgaande, orthostatische hypotensie of duizeligheid waargenomen. Deze patiënten moeten afzien van autorijden of het bedienen van machines tot de symptomen verdwenen zijn.

#### **4.8 Bijwerkingen**

##### ***Samenvatting van het veiligheidsprofiel***

De bijwerkingen die bij met teriparatide behandelde patiënten het meest werden gerapporteerd, zijn misselijkheid, pijn in de ledematen, hoofdpijn en duizeligheid.

##### ***Lijst met bijwerkingen in tabelvorm***

Van patiënten in de teriparatide-onderzoeken meldde 82,8% van de teriparatide-patiënten en 84,5% van de placebopatiënten ten minste 1 bijwerking.

Bijwerkingen die worden geassocieerd met het gebruik van teriparatide tijdens klinische studies naar osteoporose en tijdens blootstelling na het op de markt komen zijn in onderstaande tabel samengevat. De volgende regel is gebruikt voor de classificatie van de bijwerkingen: Zeer vaak ( $\geq 1/10$ ), Vaak ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), Soms ( $\geq 1/1.000$ ,  $< 1/100$ ), Zelden ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ ), Zeer zelden ( $< 1/10.000$ )

<b><i>Bloed- en lymfestelselaandoeningen</i></b>
Vaak: anemie
<b><i>Immuunsysteemaandoeningen</i></b>
Zelden: anafylaxie
<b><i>Voedings- en stofwisselingsstoornissen</i></b>
Vaak: hypercholesterolemie
Soms: hypercalciëmie, meer dan 2,76 mmol/l, hyperurikemie
Zelden: hypercalciëmie, meer dan 3,25 mmol/l
<b><i>Psychische stoornissen</i></b>
Vaak: depressie
<b><i>Zenuwstelselaandoeningen</i></b>
Vaak: duizeligheid, hoofdpijn, ischias, flauwvallen
<b><i>Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen</i></b>
Vaak: vertigo
<b><i>Hartaandoeningen</i></b>
Vaak: palpities
Soms: tachycardie
<b><i>Bloedvataandoeningen</i></b>
Vaak: hypotensie
<b><i>Ademhalings-, borstkas- en mediastinumaandoeningen</i></b>
Vaak: dyspneu
Soms: emfyseem

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
oplossing voor injectie in voorgevulde pen

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 6**

***Maagdarmstelselaandoeningen***

Vaak: misselijkheid, braken, hiatus hernia, gastro-oesofageale refluxziekte

Soms: hemorrhoiden

***Huid- en onderhuidaandoeningen***

Vaak: toegenomen transpiratie

***Skeletspierstelsel- en bindweefsel-aandoeningen***

Zeer vaak: pijn in ledematen

Vaak: spierkramp

Soms: spierpijn, gewrichtspijn, rugkrampen/-pijn\*

***Nier- en urinewegaandoeningen***

Soms: urine-incontinentie, poly-urie, plotselinge mictiedrang, nefrolithiasis

Zelden: nierfalen/nierfunctiestoornis

***Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen***

Vaak: vermoeidheid, pijn op de borst, asthenie, milde en voorbijgaande bijwerkingen op de injectieplaats, waaronder pijn, zwelling, erytheem, blauwe plekken, jeuk en lichte bloeding op de injectieplaats

Soms: erytheem op de injectieplaats, reactie op de injectieplaats

Zelden: mogelijke allergische gebeurtenissen vlak na injectie: acute dyspneu, oro/faciaal oedeem, gegeneraliseerde urticaria, pijn op de borst, oedeem (voornamelijk perifeer)

***Onderzoeken***

Soms: gewichtstoename, hartuis, verhoogd alkalische fosfatase

\* Ernstige gevallen van rugkramp/-pijn zijn gemeld binnen enkele minuten na de injectie.

***Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen***

Bij klinische studies werden de volgende bijwerkingen gemeld met  $\geq 1\%$  verschil in frequentie ten opzichte van placebo: vertigo, misselijkheid, pijn in een ledemaat, duizeligheid, depressie, dyspneu.

Teriparatide verhoogt de urinezuurconcentratie in serum. In klinische onderzoeken had 2,8% van de patiënten behandeld met teriparatide een serum urinezuur concentratie die hoger was dan de bovengrens van de normaalwaarde ten opzichte van 0,7% van de patiënten behandeld met placebo. De hyperurikemie resulteerde echter niet in een toename van jicht, gewrichtspijn of urolithiasis.

In een groot klinisch onderzoek werd bij 2,8% van de met teriparatide behandelde vrouwen antistoffen gevonden die een kruisreactie met teriparatide aangingen. In het algemeen werden de antistoffen voor het eerst waargenomen na 12 maanden behandeling en namen ze na staken van de behandeling weer af. Er waren geen aanwijzingen voor overgevoeligheidsreacties, allergische reacties, effecten op het serumcalcium of effecten op de botmineraaldichtheid (BMD)-respons.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl).

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 7**

## **4.9 Overdosering**

### ***Verschuinselen en symptomen***

Teriparatide is toegediend in enkelvoudige doses van maximaal 100 microgram en in herhaalde doses van maximaal 60 microgram/dag gedurende 6 weken.

Eventueel te verwachten effecten na overdosering zijn onder meer vertraagde hypercalciëmie en een risico van orthostatische hypotensie. Ook kunnen misselijkheid, braken, duizeligheid en hoofdpijn optreden.

### ***Ervaring met overdosering gebaseerd op spontane, post-marketing meldingen***

Bij spontane, post-marketing meldingen zijn gevallen geweest van fouten bij de behandeling met geneesmiddelen waarbij de volledige inhoud (tot 800 microgram) van de pen met teriparatide als enkelvoudige dosis is toegediend. Voorbijgaande gebeurtenissen die gemeld zijn omvatten misselijkheid, zwakte/lusteloosheid en hypotensie. In enkele gevallen traden geen bijwerkingen op als gevolg van de overdosering. Er zijn geen gevallen met dodelijke afloop in verband met overdosering gemeld.

### ***Behandeling van overdosering***

Er is geen specifiek antidotum voor Teriparatide Teva. Bij een vermoeden van overdosering moet de behandeling onder meer bestaan uit tijdelijk staken van Teriparatide Teva, controleren van het serum calcium en toepassen van adequate ondersteunende maatregelen, zoals hydratatie.

## **5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN**

### **5.1 Farmacodynamische eigenschappen**

Farmacotherapeutische groep: Calciumregulerende middelen, parathyreoïdhormonen en -analoga, ATC-code: H05AA02

### ***Werkingsmechanisme***

Endogeen 84-aminozuur-parathyreoïdhormoon (PTH) is de primaire regulator van het calcium- en fosfaatmetabolisme in het bot en de nieren. Teriparatide Teva is het actieve fragment (1-34) van endogeen humaan parathyreoïdhormoon. De fysiologische werking van PTH bestaat uit stimulering van de botvorming via directe effecten op de botvormende cellen (osteoblasten) met indirect verhoging van de resorptie van calcium in de darmen en verhoging van de tubulaire reabsorptie van calcium en de fosfaatuitscheiding door de nieren.

### ***Farmacodynamische effecten***

Teriparatide is een botvormend middel ter behandeling van osteoporose. De effecten van teriparatide op het skelet zijn afhankelijk van het patroon van systemische blootstelling. Bij toediening van

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
oplossing voor injectie in voorgevulde pen

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 8**

teriparatide eenmaal daags neemt de opbouw van nieuw bot op de trabeculaire en corticale botoppervlakken toe, doordat bij voorkeur de osteoblastenactiviteit boven de osteoclastenactiviteit wordt gestimuleerd.

***Klinische werkzaamheid***

*Risicofactoren*

Onafhankelijke risicofactoren, bv. lage BMD, leeftijd, het bestaan van eerdere fracturen, familie geschiedenis van heupfracturen, hoge botstofwisseling en lage BMI dienen overwogen te worden om vrouwen en mannen te identificeren die een verhoogd risico op osteoporose fracturen hebben en een voordeel kunnen hebben met een behandeling.

Premenopauzale vrouwen met glucocorticoïden-geïnduceerde osteoporose hebben een groot risico op fracturen indien zij een prevalentie fractuur hebben gehad of een combinatie van meerdere risicofactoren hebben dat hen een groot risico op fracturen geeft (bijvoorbeeld lage botmineraaldichtheid [bijvoorbeeld T score  $\leq -2$ ], aanhoudend gebruik van hoge doses glucocorticoïden [bijvoorbeeld  $\geq 7,5$  mg/dag gedurende ten minste 6 maanden], zeer actieve onderliggende ziekte, lage geslachtshormoon spiegels).

*Postmenopauzale osteoporose*

Het kernonderzoek omvatte 1637 postmenopauzale vrouwen (gemiddelde leeftijd 69,5 jaar). Negentig procent van de patiënten had in de uitgangssituatie één of meer vertebrale fracturen, en gemiddeld, vertebrale BMD was 0,82 g/cm<sup>2</sup> (equivalent met een T-score = -2,6). Alle patiënten kregen per dag 1000 mg calcium en ten minste 400 IE vitamine D aangeboden. Uit de resultaten tot en met maximaal 24 maanden (mediaan: 19 maanden) behandeling met teriparatide bleek een statistisch significante afname in het aantal fracturen (Tabel 1). Om één of meer nieuwe vertebrale fracturen te voorkomen moesten 11 vrouwen gedurende een mediane periode van 19 maanden worden behandeld.

**Tabel 1**

Incidentie van fracturen bij postmenopauzale vrouwen:			
	Placebo (N = 544) (%)	Teriparatide (N = 541) (%)	Relatieve risico (95% BI) vs. placebo
Nieuwe vertebrale fractuur ( $\geq 1$ ) <sup>a</sup>	14,3	5,0 <sup>b</sup>	0,35 (0,22; 0,55)
Meervoudige vertebrale fracturen ( $\geq 2$ ) <sup>a</sup>	4,9	1,1 <sup>b</sup>	0,23 (0,09; 0,60)
Niet-vertebrale fragiliteits fracturen <sup>c</sup>	5,5%	2,6% <sup>d</sup>	0,47 (0,25; 0,87)
Ernstige niet-vertebrale fragiliteits fracturen <sup>c</sup> (heup, spaaakbeen, opperarmbeen, ribben en bekken)	3,9%	1,5% <sup>d</sup>	0,38 (0,17; 0,86)

Afkortingen: N= aantal patiënten dat een gerandomiseerde behandeling toegewezen heeft gekregen; BI



**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 9**

= betrouwbaarheidsinterval.

<sup>a</sup> De incidentie van vertebrale fracturen werd bepaald uit 448 placebo- en 444 teriparatidepatiënten die baseline en vervolg wervelkolom röntgenfoto's hadden

<sup>b</sup>  $p \leq 0,001$  vergeleken met placebo

<sup>c</sup> Een significante reductie in incidentie van heupfracturen werd niet aangetoond

<sup>d</sup>  $p \leq 0,025$  vergeleken met placebo

De botmineraaldichtheid (BMD) was na 19 maanden (mediaan) behandeling in de lumbale wervelkolom en de heupen, met respectievelijk 9% en 4% toegenomen vergeleken met placebo ( $p < 0,001$ ).

Beleid na behandeling: Na de behandeling met teriparatide werden 1262 postmenopauzale vrouwen uit het kernonderzoek opgenomen in een post-treatment follow-up-onderzoek. De primaire doelstelling van het onderzoek was het verzamelen van gegevens met betrekking tot de veiligheid van teriparatide. Tijdens deze observatieperiode waren andere osteoporose behandelingen toegestaan en werd een aanvullende beoordeling van vertebrale fracturen uitgevoerd.

Gedurende een mediane periode van 18 maanden na staken van de behandeling met teriparatide nam het aantal patiënten met ten minste één nieuwe vertebrale fractuur in vergelijking met placebo met 41% af ( $p = 0,004$ ).

In een openlabelonderzoek werden 503 postmenopauzale vrouwen met ernstige osteoporose en in de voorgaande 3 jaar een fractuur als gevolg van broosheid (83% had eerder osteoporose therapie gehad) behandeld met teriparatide gedurende 24 maanden. Na 24 maanden was de gemiddelde toename vanaf uitgangsniveau in BMD (botmineraaldichtheid) van de lumbale wervelkolom, van de totale heup en van de femurhals respectievelijk 10,5%, 2,6% en 3,9%. De gemiddelde toename in BMD van 18 tot 24 maanden was 1,4%, 1,2% en 1,6% in respectievelijk de lumbale wervelkolom, de totale heup en de femurhals.

In een gerandomiseerd, dubbelblind, comparator-gecontroleerd fase 4 onderzoek van 24 maanden waren 1.360 post-menopauzale vrouwen met bevestigde osteoporose geïncludeerd. 680 deelnemers werden gerandomiseerd naar teriparatide en 680 deelnemers werden gerandomiseerd naar oraal risedronaat, 35 mg per week. Als uitgangswaardes hadden de vrouwen een gemiddelde leeftijd van 72,1 jaar en een mediaan van 2 prevalentie vertebrale fracturen; 57,9% van de patiënten kreeg een eerdere therapie met bisfosfonaat en 18,8% gebruikte tijdens de studie gelijktijdig glucocorticoïden. 1.013 (74,5%) patiënten voltooiden de 24 maanden follow-up. De gemiddelde (mediaan) cumulatieve dosis glucocorticoïd was 474,3 (66,2) mg in de teriparatide arm en 898,0 (100,0) mg in de risedronaat arm. De gemiddelde (mediaan) vitamine D inname in de teriparatide arm was 1433 IE/dag (1400 IE/dag) en was voor de risedronaat arm 1191 IE/dag (900 IE/dag). Bij de deelnemers die een uitgangsen follow-up radiografie van de wervelkolom hadden, was de incidentie van nieuwe wervelfracturen 28/516 (5,4%) bij patiënten die met teriparatide werden behandeld en 64/533 (12,0%) bij patiënten die met risedronaat werden behandeld, relatieve risico (95% CI) = 0,44 (0,29-0,68),  $p < 0,0001$ . De cumulatieve incidentie van samengevoegde klinische fracturen (klinische wervel- en niet-wervelfracturen) was 4,8% bij de teriparatide en 9,8% bij de met risedronaat behandelde patiënten,

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 10**

hazard ratio (95% CI) = 0,48 (0,32-0,74), p=0,0009.

*Osteoporose bij mannen*

Er werden 437 (gemiddelde leeftijd 58,7 jaar) mannen met hypogonadale (gedefinieerd als laag vrij testosteron in de ochtend of een verhoogde FSH of LH) of idiopathische osteoporose in klinisch onderzoek ingesloten. De botmineraaldichtheid van wervelkolom en femurhals op uitgangsniveau waren respectievelijk de gemiddelde T-scores -2,2 en -2,1. Bij aanvang had 35% van de patiënten een vertebrale fractuur en 59% een niet-vertebrale fractuur.

Alle patiënten kregen per dag 1000 mg calcium en ten minste 400 IE vitamine D aangeboden. De BMD van de lumbale wervelkolom was na 3 maanden significant toegenomen. Na 12 maanden, was de BMD in de lumbale wervelkolom en totale heup toegenomen met respectievelijk 5% en 1%, vergeleken met placebo. Echter, er werden geen significante effecten op het aantal fracturen aangetoond.

*Glucocorticoïden-geïnduceerde osteoporose*

De werkzaamheid van teriparatide bij mannen en vrouwen (N=428) die aanhoudende systemische glucocorticoïde behandeling ondergaan (gelijk aan 5 mg of meer prednison voor ten minste 3 maanden), werd aangetoond in de 18 maanden durende primaire fase van een 36 maanden durend, gerandomiseerd, dubbelblind, comparator-gecontroleerd onderzoek (alendronaat 10 mg/dag). Achtentwintig procent van de patiënten had één of meer radiografische vertebrale fracturen op baseline. Alle patiënten kregen 1000 mg calcium per dag en 800 IE vitamine D per dag.

Het onderzoek omvatte postmenopauzale vrouwen (N=277), premenopauzale vrouwen (N=67), en mannen (N=83). Op baseline hadden de postmenopauzale vrouwen een gemiddelde leeftijd van 61 jaar, gemiddelde lumbale BMD T score van -2,7, mediaan prednison equivalente dosis van 7,5 mg/dag, en 34% had één of meer radiografische vertebrale fracturen; premenopauzale vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 37 jaar, gemiddelde lumbale BMD T score van -2,5, mediaan prednison equivalente dosis van 10 mg/dag, en 9% had één of meer radiografische vertebrale fracturen; en mannen hadden een gemiddelde leeftijd van 57 jaar, gemiddelde lumbale BMD T score van -2,2, mediaan prednison equivalente dosis van 10 mg/dag, en 24% had één of meer radiografische vertebrale fracturen.

Negenenzestig procent van de patiënten volbrachten de 18 maanden durende primaire fase. Op het 18 maanden eindpunt verhoogde teriparatide significant de lumbale BMD (7,2%) vergeleken met alendronaat (3,4%) (p<0,001). Teriparatide verhoogde de BMD in de gehele heup (3,6%) vergeleken met alendronaat (2,2%)(p<0,01), evenals de femurhals BMD (3,7%) vergeleken met alendronaat (2,1%)(p<0,05). Bij patiënten behandeld met teriparatide verhoogde de BMD van de lumbale wervelkolom, van de totale heup en van de femurhals tussen de 18 en 24 maanden respectievelijk met een additionele 1,7%, 0,9% en 0,4%.

Na 36 maanden toonde analyse van spinale röntgenfoto's van 169 alendronaat patiënten en 173 teriparatide patiënten aan dat 13 patiënten in de alendronaat groep (7,7%) een nieuwe vertebrale fractuur kregen vergeleken met 3 patiënten in de teriparatide groep (1,7%) (p=0,01). Bovendien hadden

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 11**

15 van de 214 patiënten in de alendronaat groep (7,0%) een niet-vertebrale fractuur gekregen, vergeleken met 16 van de 214 patiënten in de teriparatide groep (7,5%) ( $p=0,84$ ).

Bij premenopauzale vrouwen was de toename van de BMD van baseline naar het 18-maanden-eindpunt significant groter in de teriparatide groep vergeleken met de alendronaat groep bij de lumbale BMD (4,2% versus -1,9%;  $p<0,001$ ) en de gehele heup BMD (3,8% versus 0,9%;  $p=0,005$ ). Daarentegen is er geen significant effect gezien op het aantal fracturen.

## **5.2 Farmacokinetische eigenschappen**

### ***Distributie***

Het distributievolume is ongeveer 1,7 l/kg. De halfwaardetijd van teriparatide is na subcutane toediening ongeveer 1 uur, wat de tijd weergeeft die nodig is voor absorptie vanuit de injectieplaats.

### ***Biotransformatie***

Er zijn met teriparatide geen onderzoeken uitgevoerd naar metabolisme of excretie, maar aangenomen wordt dat het perifere metabolisme van parathyreoïd hormoon voornamelijk in de lever en de nieren plaatsvindt.

### ***Eliminatie***

Teriparatide wordt via hepatische en extrahepatische klaring geëlimineerd (ongeveer 62 l/u bij vrouwen en 94 l/u bij mannen).

### ***Ouderen***

Er werden geen verschillen in de farmacokinetiek van teriparatide waargenomen met betrekking tot leeftijd (tussen 31 en 85 jaar). Aanpassing van de dosering aan de leeftijd is niet noodzakelijk.

## **5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek**

Teriparatide was niet genotoxisch in een standaardreeks testmethoden. Teriparatide veroorzaakte geen teratogene effecten bij ratten, muizen of konijnen. Er zijn geen belangrijke effecten gezien bij zwangere ratten of muizen die een dagelijkse dosis van 30 tot 1000 microgram/kg teriparatide kregen toegediend. Echter, er trad foetale resorptie en afgenomen worpgrootte op bij zwangere konijnen die een dagelijkse dosis kregen toegediend van 3 tot 100 microgram/kg. De embryotoxiciteit die gezien werd bij konijnen kan gerelateerd zijn aan hun veel grotere gevoeligheid voor de effecten van PTH op bloed geïoniseerd calcium vergeleken met knaagdieren.

Bij ratten die vrijwel hun gehele leven dagelijks werden geïnjecteerd, was sprake van dosisafhankelijke buitensporige botvorming en een toegenomen incidentie van osteosarcoom, hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een epigenetisch mechanisme. De incidentie van andere typen neoplasieën bij ratten nam niet toe door teriparatide. Door de verschillen in botfysiologie bij ratten en mensen zijn deze bevindingen waarschijnlijk weinig klinisch relevant. Er werden geen bottumoren waargenomen bij apen die ovariëctomie hadden ondergaan en gedurende 18 maanden behandeld waren en er werden ook

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 12**

geen bottumoren waargenomen gedurende een 3 jaar-durende follow-up periode na staken van de behandeling. Bovendien werden in klinische onderzoeken of tijdens het post- treatment follow-up-onderzoek geen osteosarcomen waargenomen.

In dieronderzoeken is aangetoond dat door een sterk afgenomen bloeddoorstroming van de lever blootstelling van PTH aan de belangrijkste splitsingsplaats (Kupffer-cellen) afneemt en dientengevolge eveneens de klaring van PTH(1-84).

## **6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

### **6.1 Lijst van hulpstoffen**

Geconcentreerd azijnzuur  
Natriumacetaat trihydraat  
Mannitol  
Metacresol  
Zoutzuur (voor pH-aanpassing)  
Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)  
Water voor injecties

### **6.2 Gevallen van onverenigbaarheid**

Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gecombineerd worden.

### **6.3 Houdbaarheid**

24 maanden

De chemische, fysische en microbiologische stabiliteit tijdens gebruik is aangetoond gedurende 28 dagen bij 2°C - 8°C. Na opening kan het product maximaal 28 dagen bij 2°C - 8°C worden bewaard. Andere bewaartijden en omstandigheden tijdens gebruik zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

### **6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). De pen moet na gebruik onmiddellijk in de koelkast worden teruggelegd. Niet in de vriezer bewaren.

Niet bewaren met de naald bevestigd op het injectie apparaat.

#### Het ongeopende geneesmiddel:

Het ongeopende geneesmiddel mag eenmalig, voor een periode van 5 dagen, buiten de koelkast

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 13**

bewaard worden bij een temperatuur tot 25°C. Hierna moet het geneesmiddel bewaard worden in de koelkast (2 °C – 8 °C). Gooi het ongeopende geneesmiddel weg wanneer het langer dan 5 dagen boven de 8 °C is bewaard.

### **6.5 Aard en inhoud van de verpakking**

2,4 ml oplossing in een patroon (gesiliconiseerd Type I glas) met een zuiger (halobutylrubber), schijfafsluiting (polyisopreen/bromobutylrubber laminaat)/aluminium, gemonteerd in een wegwerppen.

Teriparatide Teva is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 of 3 pennen of in een multiverpakking met 3 pennen (3 verpakkingen met 1 pen). Elke pen bevat 28 doses van 20 microgram (per 80 microliter).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### **6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies**

Teriparatide Teva wordt geleverd in een voorgevulde pen. Iedere pen dient slechts door één patiënt te worden gebruikt. Voor elke injectie moet een nieuwe steriele naald worden gebruikt. Bij alle Teriparatide Teva-verpakkingen wordt een gebruikershandleiding meegeleverd waarin het gebruik van de pen uitvoerig wordt beschreven. Er worden geen naalden met het product meegeleverd. De pen kan worden gebruikt met injectienaalden voor insulinepennen. Na iedere injectie moet de Teriparatide Teva-pen weer in de koelkast worden teruggelegd.

Teriparatide Teva dient niet te worden gebruikt als de oplossing troebel of verkleurd is of deeltjes bevat.

Raadpleeg eveneens de gebruikershandleiding voor instructies over het gebruik van de pen.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

## **7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Teva Nederland B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Nederland

## **8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

RVG 117424

**TERIPARATIDE TEVA 20 MICROGRAM/80 MICROLITER**  
**oplossing voor injectie in voorgevulde pen**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 3 mei 2024**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 14**

**9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING**

Datum van eerste verlening van de vergunning: 26 januari 2017

Datum van laatste verlenging: 11 oktober 2021

**10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST**

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 6.4: 14 april 2025