

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 1**

## **1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL**

Tapentadol retard Teva 25 mg, tabletten met verlengde afgifte  
Tapentadol retard Teva 50 mg, tabletten met verlengde afgifte  
Tapentadol retard Teva 100 mg, tabletten met verlengde afgifte  
Tapentadol retard Teva 150 mg, tabletten met verlengde afgifte  
Tapentadol retard Teva 200 mg, tabletten met verlengde afgifte  
Tapentadol retard Teva 250 mg, tabletten met verlengde afgifte

## **2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING**

Tapentadol retard Teva 25 mg, tabletten met verlengde afgifte

Elke tablet met verlengde afgifte bevat tapentadolfosfaat overeenkomend met 25 mg tapentadol.

Tapentadol retard Teva 50 mg, tabletten met verlengde afgifte

Elke tablet met verlengde afgifte bevat tapentadolfosfaat overeenkomend met 50 mg tapentadol.

Tapentadol retard Teva 100 mg, tabletten met verlengde afgifte

Elke tablet met verlengde afgifte bevat tapentadolfosfaat overeenkomend met 100 mg tapentadol.

Tapentadol retard Teva 150 mg, tabletten met verlengde afgifte

Elke tablet met verlengde afgifte bevat tapentadolfosfaat overeenkomend met 150 mg tapentadol.

Tapentadol retard Teva 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

Elke tablet met verlengde afgifte bevat tapentadolfosfaat overeenkomend met 200 mg tapentadol.

Tapentadol retard Teva 250 mg, tabletten met verlengde afgifte

Elke tablet met verlengde afgifte bevat tapentadolfosfaat overeenkomend met 250 mg tapentadol.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

## **3. FARMACEUTISCHE VORM**

Tablet met verlengde afgifte

Tapentadol retard Teva 25 mg, tabletten met verlengde afgifte

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 2**

Bruinachtige, langwerpige, biconvexe tablet met verlengde afgifte (6 mm x 12 mm) met breukstrepen op beide zijden.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Tapentadol retard Teva 50 mg, tabletten met verlengde afgifte

Witte, langwerpige, biconvexe tablet met verlengde afgifte (6 mm x 13 mm) met breukstrepen op beide zijden.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Tapentadol retard Teva 100 mg, tabletten met verlengde afgifte

Geelachtige, langwerpige, biconvexe tablet met verlengde afgifte (7 mm x 14 mm) met breukstrepen op beide zijden.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Tapentadol retard Teva 150 mg, tabletten met verlengde afgifte

Felrood-achtige, langwerpige, biconvexe tablet met verlengde afgifte (7 mm x 15 mm) met breukstrepen op beide zijden.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Tapentadol retard Teva 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

Gele, langwerpige, biconvexe tablet met verlengde afgifte (8 mm x 16 mm) met breukstrepen op beide zijden.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Tapentadol retard Teva 250 mg, tabletten met verlengde afgifte

Bruinrode, langwerpige, biconvexe tablet met verlengde afgifte (9 mm x 18 mm) met breukstrepen op beide zijden.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

## **4. KLINISCHE GEGEVENS**

### **4.1 Therapeutische indicaties**

Tapentadol retard Teva is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige chronische pijn bij volwassenen, die alleen met opioïde analgetica adequaat behandeld kan worden.

### **4.2 Dosering en wijze van toediening**

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 3**

## **Dosering**

Het doseringsregime dient individueel te worden afgestemd op de ernst van de te behandelen pijn, eerdere behandelervaring en de mogelijkheden om de patiënt te controleren.

Tapentadol retard Teva dient tweemaal daags te worden ingenomen, ongeveer eenmaal per 12 uur.

### Starten van de behandeling

*De behandeling starten bij patiënten die momenteel geen opioïde analgetica gebruiken*

Patiënten dienen de behandeling te starten met één dosis van 50 mg Tapentadol retard Teva, tweemaal daags in te nemen.

*De behandeling starten bij patiënten die momenteel al opioïde analgetica gebruiken*

Bij het overstappen van andere opiaten op Tapentadol retard Teva en het kiezen van de startdosis dient rekening te worden gehouden met de aard, de wijze van toediening en de gemiddelde dagelijkse dosis van het vorige geneesmiddel. Daarbij kan een hogere startdosis Tapentadol retard Teva nodig zijn bij patiënten die momenteel al opiaten gebruiken dan bij patiënten die voorafgaand aan behandeling met Tapentadol retard Teva geen opiaten hebben gebruikt.

### Titratie en onderhoudsbehandeling

Na aanvang van de behandeling dient de dosis onder nauwgezet toezicht van de voorschrijvend arts individueel te worden getitreerd tot een niveau waarbij adequate analgesie wordt bereikt en ongewenste effecten worden geminimaliseerd. In klinisch onderzoek is gebleken dat een titratieschema, waarbij de dosis om de 3 dagen stapsgewijs wordt verhoogd met 50 mg tapentadol met verlengde afgifte, tweemaal daags, geschikt is om afdoende analgesie te bereiken bij de meeste patiënten. Voor individuele dosisaanpassingen kan ook de 25 mg sterkte gebruikt worden.

Een totale dagelijkse dosis van meer dan 500 mg tapentadol met verlengde afgifte is nog niet onderzocht en wordt derhalve niet aanbevolen.

### Stopzetting van de behandeling

Na abrupt stoppen van de behandeling met tapentadol kunnen onthoudingsverschijnselen optreden (zie rubriek 4.8). Wanneer een patiënt niet langer met tapentadol hoeft te worden behandeld, is het raadzaam de dosis geleidelijk af te bouwen om onthoudingsverschijnselen te voorkomen.

### Speciale patiëntengroepen

#### *Nierinsufficiëntie*

Bij patiënten met lichte of matige nierinsufficiëntie is dosisaanpassing niet nodig (zie rubriek 5.2).

Tapentadol met verlengde afgifte is niet bestudeerd in gecontroleerde effectiviteitsstudies bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. Derhalve wordt gebruik bij deze populatie niet aanbevolen (zie rubrieken 4.4. en 5.2).

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 4**

#### *Leverinsufficiëntie*

Bij patiënten met lichte leverinsufficiëntie is dosisaanpassing niet nodig (zie rubriek 5.2). Tapentadol retard Teva dient voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met matige leverinsufficiëntie. Behandeling van deze patiënten dient te worden gestart met de laagste beschikbare dosis, d.w.z. Tapentadol retard Teva 25 mg, die niet vaker dan eenmaal per 24 uur mag worden ingenomen. Bij aanvang van de behandeling wordt een hogere dagelijkse dosis dan 50 mg tapentadol als tablet met verlengde afgifte niet aanbevolen. Verdere behandeling dient uit te komen op behoud van de analgesie met een acceptabele verdraagbaarheid (zie rubrieken 4.4 en 5.2). Tapentadol met verlengde afgifte is niet onderzocht bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. Derhalve wordt gebruik bij deze populatie niet aanbevolen (zie rubrieken 4.4. en 5.2).

#### *Ouderen (65 jaar en ouder)*

In het algemeen is een dosisaanpassing bij ouderen niet nodig. Bij ouderen is de kans echter groter dat de nier- en leverfunctie verminderd is. Daarom dient de dosis zorgvuldig, conform de aanbevelingen, te worden bepaald (zie rubrieken 4.2 en 5.2).

#### *Pediatrische patiënten*

De veiligheid en werkzaamheid van Tapentadol retard Teva bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Daarom wordt Tapentadol retard Teva niet aanbevolen voor gebruik bij deze populatie.

#### **Wijze van toediening**

Tapentadol retard Teva is voor oraal gebruik.

De tablet met verlengde afgifte mag niet gebroken of gekauwd worden, om ervoor te zorgen dat het mechanisme van verlengde afgifte intact blijft. Tapentadol retard Teva dient met voldoende vloeistof te worden ingenomen.

Tapentadol retard Teva kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Het omhulsel (matrix) van de tablet wordt mogelijk niet volledig verteerd en kan daardoor geëlimineerd en gezien worden in de stoelgang van de patiënt. Dit heeft echter geen klinische relevantie, aangezien het actieve bestanddeel van de tablet reeds geabsorbeerd is.

#### **4.3 Contra-indicaties**

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.
- In situaties waarin werkzame bestanddelen met mu-opioïdreceptoragonistische werking gecontra-indiceerd zijn, d.w.z. bij patiënten met aanzienlijke ademhalingsdepressie (in omstandigheden zonder bewaking of bij afwezigheid van reanimatieapparatuur) en patiënten met acute of ernstige astma bronchiale of hypercapnie.

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 5**

- In elke patiënt met een aangetoonde of vermoede paralytische ileus.
- In patiënten met acute intoxicatie met alcohol, hypnotica, centraal werkende analgetica of psychotrope werkzame bestanddelen (zie rubriek 4.5).

#### **4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik**

##### *Tolerantie en opioïdegebruiksstoornis (misbruik en afhankelijkheid)*

Tolerantie, fysieke en psychologische afhankelijkheid en een opioïdegebruiksstoornis (*opioid use disorder*, OUD) kunnen optreden bij herhaalde toediening van opioïden. Misbruik of opzettelijk verkeerd gebruik van opioïden kan leiden tot een overdosis en/of overlijden. Het risico op het ontwikkelen van OUD is verhoogd bij patiënten met een persoonlijke of familieanamnese (ouders, broer of zus) van middelengebruiksstoornissen (waaronder alcoholgebruiksstoornis), bij huidige tabaksgebruikers of bij patiënten met een persoonlijke geschiedenis van andere psychische stoornissen (bijv. zware depressie, angst- en persoonlijkheidsstoornissen).

Patiënten dienen gecontroleerd te worden op tekenen van drugszoekend gedrag (bijv. te vroege verzoeken om aanvullingen). Dit omvat de beoordeling van gelijktijdige opioïden en psychoactieve middelen (zoals benzodiazepinen). Voor patiënten met tekenen en symptomen van OUD dient overleg met een verslavingsdeskundige te worden overwogen.

##### *Risico's gerelateerd aan gelijktijdig gebruik van kalmerende geneesmiddelen zoals benzodiazepines of aanverwante stoffen*

Gelijktijdig gebruik van Tapentadol retard Teva en kalmerende geneesmiddelen zoals benzodiazepines of aanverwante stoffen kan leiden tot sedatie, ademhalingsdepressie, coma en overlijden. Vanwege deze risico's moet het gelijktijdig voorschrijven van deze kalmerende geneesmiddelen worden voorbehouden aan patiënten voor wie alternatieve behandelingsopties niet mogelijk zijn. Indien besloten wordt om Tapentadol retard Teva gelijktijdig met kalmerende geneesmiddelen voor te schrijven, dan moet een verlaging van de dosis van een of beide middelen worden overwogen en moet de duur van de gelijktijdige behandeling zo kort mogelijk zijn.

De patiënten moeten nauwlettend worden gevolgd op tekenen en symptomen van ademhalingsdepressie en sedatie. Het wordt dan ook sterk aanbevolen om patiënten en hun verzorgers te informeren over deze symptomen (zie rubriek 4.5).

##### *Ademhalingsdepressie*

In hoge doses of bij voor mu-opioïdreceptoragonisten gevoelige patiënten kan Tapentadol retard Teva dosisgerelateerde ademhalingsdepressie veroorzaken. Tapentadol retard Teva dient derhalve voorzichtig te worden toegediend aan patiënten met een verstoorde ademhalingsfunctie. Andere niet-mu-opioïdreceptoragonistische analgetica dienen te worden overwogen. Bij dergelijke patiënten mag Tapentadol retard Teva uitsluitend worden toegepast onder zorgvuldige medische supervisie bij de

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 6**

laagste werkzame dosis. Als ademhalingsdepressie ontstaat, dient dit op dezelfde wijze te worden behandeld als elke door een mu-opioïdreceptoragonist geïnduceerde ademhalingsdepressie (zie rubriek 4.9).

*Hoofddletsel en verhoogde intracraniële druk*

Tapentadol retard Teva mag niet worden gebruikt bij patiënten die bijzonder gevoelig kunnen zijn voor de intracraniële effecten van kooldioxideretentie, zoals patiënten met bewijs voor verhoogde intracraniële druk, bewustzijnsstoornis of coma. Analgetica met mu-opioïdreceptoragonistische werking kunnen het klinische beloop van patiënten met hoofddletsel maskeren. Tapentadol retard Teva dient voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met hoofddletsel en hersentumoren.

*Convulsies*

Tapentadol met verlengde afgifte is niet systematisch geëvalueerd bij patiënten met een convulsieve aandoening; dergelijke patiënten waren uitgesloten van klinisch onderzoek. Net als andere analgetica met mu-opioïdreceptor-agonistische werking wordt Tapentadol retard Teva niet aangeraden bij patiënten met een voorgeschiedenis van een convulsieve aandoening of met een aandoening waarbij de patiënt risico op convulsies loopt. Daarnaast kan tapentadol het risico op aanvallen verhogen bij patiënten die andere geneesmiddelen gebruiken die de convulsiedrempel verlagen (zie rubriek 4.5).

*Nierinsufficiëntie*

Tapentadol met verlengde afgifte is niet bestudeerd in gecontroleerde effectiviteitsstudies bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. Derhalve wordt gebruik bij deze populatie niet aanbevolen (zie rubrieken 4.2 en 5.2).

*Leverinsufficiëntie*

Bij proefpersonen met lichte of matige leverinsufficiëntie was de systemische blootstelling respectievelijk 2-voudig en 4,5-voudig toegenomen vergeleken met proefpersonen met een normale leverfunctie. Tapentadol retard Teva dient voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met matige leverinsufficiëntie (zie rubrieken 4.2 en 5.2), in het bijzonder bij aanvang van de behandeling. Tapentadol met verlengde afgifte is niet onderzocht bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie. Derhalve wordt gebruik bij deze populatie niet aanbevolen (zie rubrieken 4.2 en 5.2).

*Gebruik bij aandoeningen van de pancreas/de galwegen*

Werkzame bestanddelen met mu-opioïdreceptoragonistische werking kunnen spasmen veroorzaken van de sfincter van Oddi. Tapentadol retard Teva dient voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met een aandoening van de galwegen, inclusief acute pancreatitis.

*Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen*

Opioïden kunnen slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen veroorzaken, waaronder centrale

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 7**

slaapapneu (CSA) en slaapgerelateerde hypoxemie. Het gebruik van opioïden verhoogt het risico op CSA op dosisafhankelijke wijze. Overweeg bij patiënten met CSA om de totale opioïdendosering te verlagen.

*Gemengde opioïdagonisten/antagonisten*

Voorzichtigheid is geboden bij het gelijktijdig gebruik van Tapentadol retard Teva met gemengde mu-opioïdagonisten/antagonisten (zoals pentazocine, nalbufine) of partiële mu-opioïdagonisten (zoals buprenorfine). Bij patiënten behandeld met buprenorfine voor opioïdeverslaving, moeten alternatieve behandelingsopties overwogen worden (zoals bijvoorbeeld tijdelijke stopzetting van buprenorfine), als de toediening van zuivere mu-agonisten (zoals tapentadol) noodzakelijk wordt in geval van acute pijn situaties. Bij gecombineerd gebruik met buprenorfine werd voor zuivere mu-receptoragonisten een hogere dosisbehoefte gerapporteerd en in dergelijke gevallen is een regelmatige controle op bijwerkingen zoals ademhalingsdepressie noodzakelijk.

**4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

*Centraal werkende geneesmiddelen/middelen die het centrale zenuwstelsel (CZS) onderdrukken, met inbegrip van alcohol en CZS onderdrukkende opioïden*

Het gelijktijdig gebruik van Tapentadol retard Teva met kalmerende geneesmiddelen zoals benzodiazepines of andere middelen die de ademhaling of het centraal zenuwstelsel onderdrukken (andere opioïden, antitussiva of substitutiebehandelingen, barbituraten, antipsychotica, H1-antihistaminica en alcohol) verhogen het risico op sedatie, ademhalingsdepressie, coma en overlijden door het bijkomende dempende effect op het CZS. Wanneer een gecombineerde behandeling van Tapentadol retard Teva wordt overwogen met een middel dat de ademhaling of het centraal zenuwstelsel onderdrukt, dan moet een verlaging van de dosis van een of beide middelen worden overwogen en moet de duur van het gelijktijdige gebruik worden beperkt (zie rubriek 4.4). Gelijktijdig gebruik van opioïden en gabapentinoïden (gabapentine en pregabaline) vergroot het risico op overdosering van opioïden, onderdrukte ademhaling en overlijden.

*Gemengde opioïdagonisten/antagonisten*

Voorzichtigheid is geboden bij het gelijktijdig gebruik van Tapentadol retard Teva met gemengde mu-opioïdagonisten/antagonisten (zoals pentazocine, nalbufine) of partiële mu-opioïdagonisten (zoals buprenorfine) (zie ook rubriek 4.4).

Tapentadol retard Teva kan convulsies induceren en kan de kans vergroten op het veroorzaken van convulsies door selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's), serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI's), tricyclische antidepressiva, antipsychotica en andere middelen die de convulsiedrempel verlagen.

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 8**

Er zijn meldingen van een serotoninesyndroom geweest in een tijdsrelatie met het therapeutisch gebruik van tapentadol in combinatie met serotonergische geneesmiddelen zoals de selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRIs), serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI's) en tricyclische antidepressiva.

De volgende verschijnselen kunnen duiden op een serotoninesyndroom:

- spontane clonus
- induceerbare clonus of oculaire clonus met agitatie of diaforese
- tremor en hyperreflexie
- hypertonie en lichaamstemperatuur > 38°C en induceerbare of oculaire clonus.

Staken van de serotonerge geneesmiddelen leidt meestal tot een snelle verbetering. Behandeling hangt af van de aard en de ernst van de symptomen.

De belangrijkste eliminatieroute voor tapentadol is conjugatie met glucuronzuur gemedieerd via uridinedifosfaattransferase (UGT), voornamelijk de isovormen UGT1A6, UGT1A9 en UGT2B7. Gelijktijdige toediening van sterke remmers van deze iso-enzymen (b.v. ketoconazol, fluconazol, meclofenaminezuur) kan derhalve leiden tot verhoogde systemische blootstelling aan tapentadol (zie rubriek 5.2).

Bij patiënten die tapentadol gebruiken is voorzichtigheid geboden als gelijktijdige toediening van sterke enzyminducerende geneesmiddelen (bijvoorbeeld rifampicine, fenobarbital, Sint-Janskruid (*Hypericum perforatum*)) wordt gestart of gestopt, omdat dit kan leiden tot respectievelijk een verminderde werkzaamheid of een risico op bijwerkingen.

Behandeling met Tapentadol retard Teva dient te worden vermeden bij patiënten die monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) krijgen of deze in de voorgaande 14 dagen hebben gebruikt; gelijktijdige behandeling heeft mogelijk additieve effecten op de synaptische noradrenalineconcentraties, wat kan resulteren in ongewenste cardiovasculaire effecten, zoals een hypertensieve crisis.

#### **4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

##### **Zwangerschap**

Er zijn zeer weinig gegevens over het gebruik van tapentadol bij zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek zijn geen teratogene effecten gebleken. Bij doses die resulteerden in krachtige farmacologische effecten (mu-opioïd-gerelateerde CZS effecten gerelateerd aan dosering boven de therapeutische range), werden echter vertraagde ontwikkeling en embryotoxiciteit waargenomen. Reeds bij de maternale NOAEL (no observed adverse effect level) werden effecten op de postnatale ontwikkeling



TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 9**

waargenomen (zie rubriek 5.3).

Tapentadol retard Teva mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het mogelijke voordeel opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus. Langdurig gebruik van opioïden door de moeder tijdens de zwangerschap stelt de foetus ook bloot aan opioïden. De pasgeborene baby kan als gevolg het neonataal opioïd ontwenningssyndroom (NOWS) ervaren. Het neonataal opioïd ontwenningssyndroom kan levensbedreigend zijn als het niet wordt herkend en behandeld. Een antidotum voor de pasgeborene moet direct beschikbaar zijn.

#### *Weeën en bevalling*

Het effect van tapentadol op de weeën en de bevalling bij mensen is onbekend. Tapentadol retard Teva wordt niet aanbevolen voor gebruik bij vrouwen tijdens en onmiddellijk voor de weeën en de bevalling. Vanwege de mu-opioïdreceptoragonistische werking van tapentadol dienen pasgeborenen van wie de moeder tapentadol heeft gebruikt, te worden gecontroleerd op ademhalingsdepressie.

#### **Borstvoeding**

Er is geen informatie over de uitscheiding van tapentadol in de moedermelk bij mensen. Uit een studie met rattenjongen die gezoogd werden door vrouwtjes die tapentadol toegediend kregen, bleek dat tapentadol in de moedermelk wordt uitgescheiden (zie rubriek 5.3). Daarom kan een risico voor de zuigeling niet worden uitgesloten. Tapentadol retard Teva mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

#### **Vruchtbaarheid**

Er zijn geen gegevens bij de mens over het effect van Tapentadol retard Teva op de vruchtbaarheid. In een onderzoek naar vruchtbaarheid en vroege embryonale ontwikkeling werden geen effecten op de voortplantingsparameters waargenomen bij mannelijke of vrouwelijke ratten (zie rubriek 5.3).

#### **4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen**

Tapentadol retard Teva kan grote invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen aangezien dit middel functies van het centraal zenuwstelsel negatief kan beïnvloeden (zie rubriek 4.8). Dit kan zich vooral voordoen bij het begin van de behandeling, bij elke dosisaanpassing en bij gelijktijdig gebruik van alcohol of kalmeringsmiddelen (zie rubriek 4.4.). De patiënt dient nadrukkelijk te worden verteld of autorijden of het bedienen van machines toegestaan is.

#### **4.8 Bijwerkingen**

De bijwerkingen die door patiënten in placebogecontroleerde studies met tapentadol met verlengde afgifte werden ervaren, waren voornamelijk mild en matig van ernst. De meest frequente bijwerkingen

**TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 10**

hadden betrekking op het maagdarmkanaal en het centraal zenuwstelsel (misselijkheid, duizeligheid, obstipatie, hoofdpijn en somnolentie).

Onderstaande tabel bevat een overzicht van bijwerkingen die waargenomen zijn in klinische studies met tapentadol met verlengde afgifte en vanuit post-marketing ervaring.

De bijwerkingen zijn ingedeeld per systeem/orgaanklasse en frequentie. De frequenties zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak ( $\geq 1/10$ ), vaak ( $\geq 1/100$  tot  $< 1/10$ ), soms ( $\geq 1/1.000$  tot  $< 1/100$ ), zelden ( $\geq 1/10.000$  tot  $< 1/1.000$ ), zeer zelden ( $< 1/10.000$ ), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

<b>BIJWERKINGEN</b>					
<b>Systeem/orgaan-klasse</b>	<b>Frequentie</b>				
	<b>Zeer vaak</b>	<b>Vaak</b>	<b>Soms</b>	<b>Zelden</b>	<b>Niet bekend</b>
<b>Immuunsysteemaandoeningen</b>			Overgevoeligheid voor het geneesmiddel*		
<b>Voedings- en stofwisselingsstoornissen</b>		Verminderde eetlust	Gewichtsverlies		
<b>Psychische stoornissen</b>		Angst, depressieve stemming, slaapstoornis, nervositeit, rusteloosheid	Desoriëntatie, verwardheid, agitatie, perceptiestoornissen, abnormale dromen, euforische stemming	Geneesmiddelafhankelijkheid, abnormale gedachten	Delirium**
<b>Zenuwstelselaandoeningen</b>	Duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn	Aandachtstoornis, tremor, onwillekeurige spiercontracties	Verlaagd bewustzijn, geheugenstoornis, psychische stoornis, syncope, sedatie, evenwichtsstoornis, dysartrie, hypo-esthesie, paresthesie	Convulsie, presyncope, abnormale coördinatie	
<b>Oogaandoeningen</b>			Visuele stoornis		
<b>Hartaandoeningen</b>			Versnelde hartslag, vertraagde hartslag, hartkloppingen		
<b>Bloedvat-aandoeningen</b>		Blozen	Verlaagde bloeddruk		

**TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 11**

**BIJWERKINGEN**

Systeem/orgaan-klasse	Frequentie				
	Zeer vaak	Vaak	Soms	Zelden	Niet bekend
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinum-aandoeningen		Dyspneu		Ademhalingsdepressie	
Maagdarmstelselaandoeningen	Misselijkheid, obstipatie	Braken, diarree, dyspepsie	Abdominaal ongemak	Verstoorde maaglediging	
Huid- en onderhuidaandoeningen		Pruritus, hyperhidrose, huiduitslag	Urticaria		
Nier- en urinewegaandoeningen			Moeite met urineren, pollakisurie		
Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen			Seksuele disfunctie		
Algemene aandoeningen en toedieningsstoornissen		Asthenie, vermoeidheid, gevoel dat de lichaamstemperatuur verandert, droge mucosa, oedeem	Onthoudingssyndroom, zich abnormaal voelen, prikkelbaarheid	Dronken gevoel, ontspannen gevoel	

*\*Post-marketing werden zeldzame gevallen van angio-oedeem, anafylaxie en anafylactische shock gerapporteerd.*

*\*\*Post-marketinggevallen van delirium werden waargenomen bij patiënten met aanvullende risicofactoren zoals kanker en gevorderde leeftijd*

Klinische studies met tapentadol met verlengde afgifte waarbij patiënten tot 1 jaar werden blootgesteld, leverden weinig bewijs voor onthoudingsverschijnselen na abrupt staken van de behandeling. En indien deze symptomen zich voordeden, werden ze over het algemeen als mild geclassificeerd. Niettemin dienen artsen alert te zijn op onthoudingsverschijnselen (zie rubriek 4.2) en, mochten deze optreden, de patiënt dienovereenkomstig te behandelen.

Het risico op suïcidale gedachten en het plegen van zelfmoord is hoger bij patiënten die aan chronische pijn lijden. Verder zijn stoffen met een uitgesproken invloed op het monoaminerge systeem geassocieerd met een verhoogd risico op suïcidaliteit bij patiënten die aan depressie lijden, vooral in het begin van de behandeling. Gegevens uit klinische studies en post-marketingrapporten duiden niet op een verhoogd risico voor tapentadol.

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 12**

#### Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl).

## **4.9 Overdosering**

### *Symptomen*

Er is zeer beperkte ervaring bij de mens met overdosering van tapentadol. Preklinische gegevens duiden erop dat na intoxicatie met tapentadol symptomen te verwachten zijn die vergelijkbaar zijn met die van andere centraal werkende analgetica met mu-opioïdreceptoragonistische activiteit. In principe bestaan deze symptomen, verwijzend naar de klinische setting, met name uit miose, braken, cardiovasculaire collaps, bewustzijnsstoornissen tot en met coma, convulsies en ademhalingsdepressie tot en met ademhalingsstilstand.

### *Behandeling*

De behandeling van overdosering dient gericht te zijn op behandeling van symptomen van mu-opioïdagonisme. Wanneer overdosering met tapentadol wordt vermoed, dient primaire aandacht te worden besteed aan het vrijmaken van de luchtwegen en het instellen van geassisteerde of gecontroleerde beademing.

Zuivere opioïdreceptorantagonisten, zoals naloxon, zijn specifieke antidota tegen ademhalingsdepressie als gevolg van overdosering met opioïden. Ademhalingsdepressie na een overdosering kan langer duren dan de werkingsduur van de opioïdreceptorantagonist. Toediening van een opioïdreceptorantagonist is geen substituut voor continue controle van de luchtwegen, de ademhaling en de circulatie na een overdosering met opioïden. Als de respons op de opioïdreceptorantagonist suboptimaal of slechts van korte duur is, dient een extra dosis van de antagonist (bijvoorbeeld naloxon) te worden toegediend conform de aanwijzingen van de fabrikant van het geneesmiddel.

Gastro-intestinale decontaminatie kan worden overwogen om niet-geabsorbeerd werkzaam bestanddeel te elimineren. Binnen 2 uur na inname kan gastro-intestinale decontaminatie met geactiveerde kool of door maagspoeling worden overwogen. Voordat gastro-intestinale decontaminatie wordt geprobeerd, moeten eerst maatregelen genomen worden om de luchtweg open te houden.

## **5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN**

### **5.1 Farmacodynamische eigenschappen**

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 13**

Farmacotherapeutische categorie: analgetica; opiaten; andere opiaten. ATC-code: N02AX06.

Tapentadol is een krachtig analgeticum met mu-opioïdagonistische en bijkomende noradrenalineheropnameremmende eigenschappen. Tapentadol oefent zijn analgetische effecten rechtstreeks uit zonder farmacologisch actieve metaboliet.

#### *Effecten op het cardiovasculaire systeem*

In een grondig humaan QT-onderzoek werd geen effect van meerdere therapeutische en supratherapeutische doses tapentadol op het QT-interval aangetoond. Tapentadol had ook geen relevant effect op andere ECG-parameters (hartfrequentie, PR-interval, QRS-duur, morfologie van de T-golf of de U-golf).

#### *Post-marketing data*

Twee post-marketing studies werden uitgevoerd met als onderwerp het praktische gebruik van tapentadol.

De effectiviteit van tapentadol tabletten met verlengde afgifte is geverifieerd in een multicenter, gerandomiseerde, dubbel blinde parallel-groep studie met patiënten met lage rugpijn met een neuropathische component (KF5503/58). De reductie in gemiddelde pijnintensiteit in de groep waarbij tapentadol werd toegediend, was vergelijkbaar aan deze in de comparator groep, waarbij een combinatie van tapentadol tabletten met verlengde afgifte samen met pregabaline tabletten met onmiddellijke afgifte werd toegediend.

In een open-label, multicenter, gerandomiseerde studie met patiënten met ernstige chronische lage rugpijn met een neuropathische component (KF5503/60), werden tapentadol tabletten met verlengde afgifte tabletten geassocieerd met significante reducties in gemiddelde pijnintensiteit.

#### *Pediatrische patiënten*

Het Europese Geneesmiddelen Bureau heeft de verplichting uitgesteld om de resultaten van onderzoek met het referentiegeneesmiddel dat tapentadol bevat in alle subgroepen van de pediatrische populatie met ernstige chronische pijn in te dienen (zie rubriek 4.2 voor informatie over pediatrisch gebruik).

## **5.2 Farmacokinetische eigenschappen**

### Absorptie

De gemiddelde absolute biologische beschikbaarheid na eenmalige toediening (nuchter) van tapentadol tabletten met verlengde afgifte is ongeveer 32% als gevolg van een uitgebreid first-pass-metabolisme. De maximale serumconcentraties van tapentadol worden tussen 3 en 6 uur na toediening van tabletten met verlengde afgifte waargenomen.

**TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 14**

Na toediening van de tabletten met verlengde afgifte over het gehele therapeutische dosisbereik zijn dosisproportionele verhogingen van de AUC waargenomen. In een onderzoek met meervoudige doses waarbij tweemaal daags 86 mg en 172 mg tapentadol werd toegediend in de vorm van tabletten met verlengde afgifte werd een accumulatieverhouding van ongeveer 1,5 voor de moederstof gevonden, wat hoofdzakelijk bepaald wordt door het toedieningsinterval en de schijnbare halfwaardetijd van tapentadol. Steady state serumconcentraties van tapentadol werden bereikt op de tweede dag van het behandelingsregime.

Effect van voedsel

Wanneer tabletten met verlengde afgifte na een vet- en calorierijk ontbijt werden toegediend, namen de AUC en de  $C_{max}$  toe met respectievelijk 8% en 18%. Dit werd als klinische niet relevant beschouwd omdat dit binnen de normale interindividuele variabiliteit van de farmacokinetische parameters van tapentadol valt. Tapentadol retard Teva kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Distributie

Tapentadol wordt uitgebreid in het gehele lichaam gedistribueerd. Na intraveneuze toediening is het distributievolume ( $V_z$ ) voor tapentadol 540 +/- 98 l. De serumeiwitbinding is laag en bedraagt ongeveer 20%.

Biotransformatie

Bij mensen wordt tapentadol uitgebreid gemetaboliseerd. Ongeveer 97% van de moederstof wordt gemetaboliseerd. De belangrijkste metaboliseroute van tapentadol is conjugatie met glucuronzuur tot glucuroniden. Na orale toediening wordt ongeveer 70% van de dosis via de urine uitgescheiden in geconjugeerde vorm (55% glucuronide en 15% sulfaat van tapentadol).

Uridinedifosfaatglucuronyltransferase (UGT) is het primaire enzym dat bij de glucuronidering betrokken is (voornamelijk de isovormen UGT1A6, UGT1A9 en UGT2B7). In totaal wordt 3% van het werkzame bestanddeel in ongewijzigde vorm uitgescheiden via de urine. Tapentadol wordt bovendien door CYP2C9 en CYP2C19 gemetaboliseerd tot N-desmethyltapentadol (13%) en door CYP2D6 tot hydroxytapentadol (2%), die verder gemetaboliseerd worden door conjugatie. Daarom is het metabolisme van het werkzame bestanddeel dat door het cytochroom P450-systeem wordt gemedieerd, minder belangrijk dan de glucuronidatie.

Geen van de metabolieten draagt bij aan de analgetische activiteit.

Eliminatie

Tapentadol en zijn metabolieten worden vrijwel uitsluitend (99%) via de nieren uitgescheiden. De totale klaring na intraveneuze toediening is 1530 +/- 177 ml/min. De terminale halfwaardetijd na orale toediening is gemiddeld 5-6 uur.

Speciale patiëntengroepen

**TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 15**

*Ouderen*

In een studie met oudere proefpersonen (65-78 jaar) was de gemiddelde blootstelling (AUC) aan tapentadol vergelijkbaar met die van jonge volwassenen (19-43 jaar), waarbij de gemiddelde  $C_{max}$  in de groep met oudere proefpersonen 16% lager was dan in de groep met jonge volwassen proefpersonen.

*Nierinsufficiëntie*

Bij proefpersonen met een wisselende mate van nierfunctie (van normaal tot ernstig gestoord) waren de AUC en  $C_{max}$  van tapentadol vergelijkbaar. Daarentegen werd een verhoogde blootstelling (AUC) aan tapentadol-O-glucuronide waargenomen naargelang de mate van nierinsufficiëntie toenam. Bij proefpersonen met lichte, matige en ernstige nierinsufficiëntie was de AUC van tapentadol-O-glucuronide respectievelijk 1,5-, 2,5- en 5,5-maal hoger dan bij een normale nierfunctie.

*Leverinsufficiëntie*

Bij proefpersonen met leverinsufficiëntie resulteerde toediening van tapentadol in een hogere blootstelling aan en hogere serumconcentraties van tapentadol dan bij proefpersonen met een normale leverfunctie. De verhouding van farmacokinetische parameters van tapentadol voor de groepen met lichte en matige leverinsufficiëntie vergeleken met de groep met een normale leverfunctie waren respectievelijk 1,7 en 4,2 voor de AUC, respectievelijk 1,4 en 2,5 voor de  $C_{max}$  en respectievelijk 1,2 en 1,4 voor de  $t_{1/2}$ . Tapentadol-O-glucuronide werd trager gevormd naarmate de leverinsufficiëntie ernstiger was.

Farmacokinetische relaties

Tapentadol wordt hoofdzakelijk gemetaboliseerd door glucuronidering en slechts een kleine hoeveelheid wordt gemetaboliseerd door oxidatieve routes.

Aangezien glucuronidering een systeem met hoge capaciteit en lage affiniteit is dat zelfs bij ziekte niet gemakkelijk verzadigd raakt, en aangezien therapeutische concentraties van werkzame bestanddelen in het algemeen aanzienlijk lager zijn dan de concentraties die nodig zijn om glucuronidering eventueel te remmen, is het onwaarschijnlijk dat er klinisch relevante interacties zullen plaatsvinden die veroorzaakt worden door glucuronidatie. In een reeks geneesmiddelinteractiestudies met paracetamol, naproxen, acetylsalicylzuur en probenecide is mogelijke invloed van deze werkzame bestanddelen op de glucuronidering van tapentadol onderzocht. De studies met de werkzame bestanddelen naproxen (500 mg tweemaal daags gedurende 2 dagen) en probenecide (500 mg tweemaal daags gedurende 2 dagen) toonden een toename van de AUC van tapentadol met respectievelijk 17% en 57%. In deze studies werden in het algemeen geen klinisch relevante effecten op de serumconcentraties van tapentadol waargenomen. Verder zijn interactiestudies met metoclopramide en omeprazol uitgevoerd om na te gaan of deze werkzame bestanddelen mogelijk van invloed zijn op de absorptie van tapentadol. Ook in deze studies zijn geen klinisch relevante effecten gebleken op de serumconcentraties van tapentadol.

Uit *in vitro* studies bleek niet dat tapentadol cytochroom P450-enzymen remt of induceert. Het is

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 16**

derhalve onwaarschijnlijk dat klinisch relevante interacties optreden die gemedieerd worden door het cytochroom P450-systeem.

De plasma-eiwitbinding van tapentadol is laag (ongeveer 20%). De kans op farmacokinetische geneesmiddelinteracties als gevolg van verdringing van de eiwitbindingsplaats is derhalve laag.

### **5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek**

Tapentadol was niet genotoxisch in bacteriën in de Ames-test. Een *in vitro* chromosomale aberratietest leverde tegenstrijdige bevindingen op, maar bij herhaling van de test waren de resultaten duidelijk negatief. Tapentadol was niet genotoxisch *in vivo*, met chromosomale aberratie en ongeplande DNA-synthese als de twee eindpunten, wanneer het getest werd tot de maximaal verdragen dosis. Langetermijnstudies bij dieren wezen niet op een potentieel carcinogeen risico dat relevant is voor de mens.

Tapentadol had bij ratten geen invloed op de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid, maar bij de hoge dosis was de *in utero* overleving verminderd. Niet bekend is of dit via het mannetje of het vrouwtje werd gemedieerd. Tapentadol had geen teratogene effecten bij ratten en konijnen na intraveneuze en subcutane blootstelling. Vertraagde ontwikkeling en embryotoxiciteit werden echter waargenomen na toediening van doses die resulteerden in krachtige farmacologische effecten ( $\mu$ -opioïd gerelateerde CZS effecten gerelateerd aan dosering boven de therapeutische range). Na intraveneuze toediening aan ratten was de *in utero* overleving verminderd. Bij ratten veroorzaakte tapentadol al in doseringen die geen maternale toxiciteiten veroorzaakten, een verhoogde mortaliteit van F1-nakomelingen die tussen dag 1 en dag 4 postpartum rechtstreeks via de moedermelk werden blootgesteld. Er waren geen effecten op neurologische gedragsparameters. Uitscheiding in moedermelk werd onderzocht bij rattenjongen die gezoogd werden door vrouwtjes die tapentadol toegediend kregen. De jongen werden dosisafhankelijk blootgesteld aan tapentadol en tapentadol-O-glucuronide. Geconcludeerd werd dat tapentadol in moedermelk wordt uitgescheiden.

## **6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

### **6.1 Lijst van hulpstoffen**

#### Tabletkern

Microkristallijne cellulose (E460)

Hypromellose (E464)

Silica, colloïdaal watervrij (E551)

Magnesiumstearaat



TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 17**

#### Tabletomhulling

Hypromellose (E464)

Glycerol (E422)

Talk (E553b)

Microkristallijne cellulose (E460)

Titaniumdioxide (E171)

Rood ijzeroxide (E172) (alleen 25, 100, 150, 200 en 250 mg sterkte)

Geel ijzeroxide (E172) (alleen 25, 100 en 200 mg sterkte)

Zwart ijzeroxide (E172) (alleen 25, 100, 150, 200 en 250 mg sterkte)

### **6.2 Gevallen van onverenigbaarheid**

Niet van toepassing.

### **6.3 Houdbaarheid**

2 jaar

### **6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

### **6.5 Aard en inhoud van de verpakking**

Moeilijk te openen voor kinderen, PVC/PE/PVDC-aluminium, geperforeerde eenheidsafleverblisterverpakking.

#### Tapentadol retard Teva 25 mg, tabletten met verlengde afgifte

20x1 tabletten met verlengde afgifte

30x1 tabletten met verlengde afgifte

40x1 tabletten met verlengde afgifte

50x1 tabletten met verlengde afgifte

54x1 tabletten met verlengde afgifte

60x1 tabletten met verlengde afgifte

100x1 tabletten met verlengde afgifte

#### Tapentadol retard Teva 50 mg/ 100 mg/ 150 mg/ 200 mg/ 250 mg, tabletten met verlengde afgifte

20x1 tabletten met verlengde afgifte

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

Datum : 17 oktober 2022

1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken

Bladzijde : 18

24x1 tabletten met verlengde afgifte  
30x1 tabletten met verlengde afgifte  
50x1 tabletten met verlengde afgifte  
54x1 tabletten met verlengde afgifte  
60x1 tabletten met verlengde afgifte  
100x1 tabletten met verlengde afgifte

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

## 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient in overeenstemming met lokale voorschriften te worden vernietigd.

## 7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.  
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem  
Nederland

## 8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVG 129629	Tapentadol retard Teva 25 mg, tabletten met verlengde afgifte
RVG 129630	Tapentadol retard Teva 50 mg, tabletten met verlengde afgifte
RVG 129631	Tapentadol retard Teva 100 mg, tabletten met verlengde afgifte
RVG 129632	Tapentadol retard Teva 150 mg, tabletten met verlengde afgifte
RVG 129633	Tapentadol retard Teva 200 mg, tabletten met verlengde afgifte
RVG 129634	Tapentadol retard Teva 250 mg, tabletten met verlengde afgifte

## 9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 11 november 2022

TAPENTADOL RETARD TEVA 25 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 50 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 100 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 150 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 200 MG  
TAPENTADOL RETARD TEVA 250 MG  
tabletten met verlengde afgifte

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**

**Datum : 17 oktober 2022**

**1.3.1 : Samenvatting van de productkenmerken**

**Bladzijde : 19**

## **10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST**

1022.2v.FN carve-out