

## 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Verapamil HCl Sandoz retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte  
Verapamil HCl Sandoz retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

## 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Werkzaam bestanddeel:

Verapamil HCl Sandoz retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte:  
1 tablet met gereguleerde afgifte bevat 120 mg verapamilhydrochloride.

Verapamil HCl Sandoz retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte:  
1 tablet met gereguleerde afgifte bevat 240 mg verapamilhydrochloride.

Hulpstoffen met bekend effect:

Verapamil HCl Sandoz retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte:  
1 tablet met gereguleerde afgifte bevat 3,56 mg lactose (als monohydraat).

Verapamil HCl Sandoz retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte:  
1 tablet met gereguleerde afgifte bevat 8,84 mg lactose (als monohydraat).  
1 tablet met gereguleerde afgifte bevat 32,1 mg natrium.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

## 3. FARMACEUTISCHE VORM

Tabletten met gereguleerde afgifte

Verapamil HCl Sandoz retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte:  
Beige tot oker, ronde filmomhulde tablet met een diameter van ongeveer 11 mm. Aan een zijde een breukstreep en glad aan de andere zijde. De breukstreep dient niet om de tablet te breken.

Verapamil HCl Sandoz retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte:  
Licht groen, langwerpige filmomhulde tablet van ongeveer 19 x 8 mm. Aan een zijde een breukstreep en glad aan de andere zijde. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

## 4. KLINISCHE GEGEVENS

### 4.1 Therapeutische indicaties

Lichte tot matige hypertensie.

Angina pectoris, inclusief Prinzmetal-angina (profylactisch), in het bijzonder bij patiënten bij wie bètablokkers gecontraïndiceerd zijn.

Profylaxe na een doorgemaakt myocardinfarct, ter voorkoming van reïnfarcten, bij patiënten die niet in aanmerking komen voor behandeling met een bètablokker.

### 4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

De dosering van Verapamil HCl Sandoz retard wordt individueel door titratie vastgesteld.

### **Volwassenen:**

#### *Hypertensie:*

De begin dosis bedraagt 120 mg per dag, 's morgens in te nemen; deze dosering kan verhoogd worden tot 240 mg eenmaal daags, hetgeen de normale onderhoudsdosering is. Bij onvoldoende resultaat kan eventueel 's avonds nog 120 tot 240 mg ingenomen worden.

#### *Angina pectoris:*

De begin dosis bedraagt 240 mg. Deze dosis kan verhoogd worden tot tweemaal per dag 240 mg, hetgeen de normale onderhoudsdosering is.

#### *Profylaxe van reïnfarct:*

De dosering bedraagt 360 mg per dag, verdeeld over 2 giften. De behandeling dient in de tweede week na het myocardinfarct te worden aangevangen.

#### *Bijzondere patiëntengroepen*

##### Ouderen:

Voor ouderen is er geen aanpassing van de startdosis vereist. Het bloeddrukverlagende effect van verapamil blijkt niet leeftijd-gerelateerd te zijn (zie rubriek 5.2).

##### Patiënten met een verminderde nierfunctie:

Er is geen dosisreductie nodig bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Verapamilhydrochloride dient echter voorzichtig te worden toegepast en zorgvuldig gecontroleerd te worden (zie rubriek 4.4. en 5.2).

##### Patiënten met een verminderde leverfunctie:

Bij patiënten met een verminderde leverfunctie dient de dosering voorzichtig te worden aangepast. In eerste instantie moet met de laagste dosering worden begonnen (zie rubriek 4.4. en 5.2).

### **Pediatrische patiënten:**

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van verapamil bij kinderen.

### **Wijze van toediening**

De tabletten kunnen met wat water worden ingenomen.

De tabletten mogen niet gekauwd worden.

Het is niet bekend of de werking van verapamil wordt beïnvloed door de inname van voedsel.

### **4.3 Contra-indicaties**

- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen.
- Decompensatio cordis.
- Cardiogene shock.
- Tweede- of derdegraads AV-blok.
- Sick sinus syndroom.
  - Atriumfibrilleren en atriumfladderen bij aanwezigheid van een extra bypass (bijv.
  - Wolff-Parkinson-White-syndroom of Lown-Ganong-Levine-syndroom).
- Ernstige sinusbradycardie.
- Hypotensie.
- Gecomliceerd recent hartinfarct.
- Intraveneuze combinatie met bèta-blokkers.
- Combinatie met ivabradine (zie rubriek 4.5)

#### 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

##### **Hartblok/eerstegraads AV-blok**

Verapamilhydrochloride beïnvloedt de AV- en SA-knopen en verlengt de AV-geleidingstijd. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van verapamilhydrochloride bij patiënten met een eerstegraads AV-blok.

##### **Antiarritmica en bètablokkers**

Gelijktijdige toediening van verapamil en antiarritmica of bètablokkers kan leiden tot versterking van cardiovasculaire effecten (AV-blok, bradycardie, inductie van hartfalen en potentiële hypotensie) (zie rubriek 4.5).

##### **Digoxine**

Bij gelijktijdige toediening van verapamil en digoxine is verhoging van de digoxine-spiegel beschreven. Daarom dient te worden gelet op symptomen van digoxine-intoxicatie. Zo nodig moet de dosering van het hartglycoside worden verlaagd (zie rubriek 4.5).

##### **HMG-CoA-reductaseremmers ('statinen')**

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die statines gebruiken (zie rubriek 4.5).

##### **Aandoeningen met betrekking tot de neuromusculaire transmissie**

Voorzichtigheid is geboden bij ziekten waarbij de neuromusculaire transmissie is aangedaan (myasthenia gravis, Lambert-Eaton-syndroom, gevorderde Duchenne spierdystrofie).

##### **Nier- en leverfunctiestoornis**

Hoewel aangetoond is dat een verminderde nierfunctie geen invloed heeft op de farmacokinetiek van verapamil, wordt aangeraden patiënten met nierfunctiestoornissen zorgvuldig te controleren, omdat er verschillende gevallen zijn gemeld van dosisafhankelijke bijwerkingen bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Bij patiënten met een verminderde leverfunctie dient de dosering te worden aangepast en dient verapamil met voorzichtigheid te worden toegepast.

Het meten van de bloeddruk ter controle van het effect van verapamil retard dient voor de volgende dosis te geschieden.

##### Verapamil HCl Sandoz retard bevat lactose en natrium

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, algehele lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

120 mg, tabletten:

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

240 mg, tabletten:

Dit geneesmiddel bevat 32,1 mg natrium per tablet, overeenkomend met 1,6% van de door de WHO aanbevolen maximale dagelijkse inname van 2 g voor een volwassene.

#### 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Interacties met andere geneesmiddelen treden op als gevolg van farmacodynamische of farmacokinetische interacties of een combinatie van beide. In die gevallen waarbij de interacties met

zowel farmacologische als farmacokinetische interacties in verband worden gebracht, wordt een kruisreferentie naar de relevante rubriek gemaakt.

In *in vitro* studies is aangetoond dat verapamil wordt gemetaboliseerd door het cytochroom P450 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 en CYP2C18. Verapamil is een bekend substraat van het CYP3A4. Tevens is verapamil een remmer van het CYP1A, CYP2C en CYP3A4. Verder remt verapamil de transporter P-glycoproteïne (P-gp).

### **Voorzorgen bij gebruik**

#### *Lithium:*

Er is melding gemaakt van zowel een versterking van de effecten van lithium als gevolg van een farmacodynamische interactie, als afname van de serum lithiumconcentraties. Serumspiegels dienen regelmatig bepaald te worden. Toegenomen neurotoxiciteit van lithium is ook waargenomen.

#### *Digoxine:*

Het gelijktijdig gebruik van verapamil met digoxine heeft bij gezonde volwassenen geleid tot een toename van de digoxine- $C_{max}$  met ongeveer 44%, van de digoxine- $C_{12h}$  met ongeveer 53%, van de digoxine- $C_{ss}$  met ongeveer 44% en van de digoxine-AUC met ongeveer 50%. Bij patiënten zijn zelfs hogere digoxine-spiegels waargenomen, soms met een toename van meer dan 100%. Verlaag de dosis digoxine.

Men moet daarom bedacht zijn op symptomen van digoxine intoxicatie. Gelijktijdig gebruik van verapamil en digoxine kan tot ongewenste additionele effecten op de AV-geleiding leiden en de hartslag verder verlagen. Indien nodig dient de dosis van het hartglycoside te worden verminderd (zie ook 'Farmacokinetische interacties met verapamil').

#### *Antihypertensiva en diuretica:*

Het hypotensieve effect van verapamil wordt versterkt (zie ook 'Farmacokinetische interacties met verapamil'). Eventueel kan de dosering van het antihypertensivum worden verlaagd.

#### *Cardiodepressiva:*

De gelijktijdige toediening van verapamil en geneesmiddelen die cardiodepressief werken, respectievelijk de prikkelvorming of -geleiding remmen (klasse II anti-aritmica, zoals bètablokkers, en klasse I/III anti-aritmica, zoals flecaïnide en amiodaron, inhalatie-anesthetica), kan leiden tot ongewenste additieve effecten (AV-blok, bradycardie, hypotensie, decompensatio cordis) (zie ook 'Farmacokinetische interacties met verapamil').

De intraveneuze toediening van bètablokkers dient tijdens de behandeling met verapamil niet plaats te vinden. Vooral de combinatie van verapamil met bètablokkers kan aanleiding geven tot een sterke AV-geleidingsstoornis, hetgeen in sommige gevallen kan leiden tot ventriculaire asystolie; tevens kan een ernstige cardiodepressie ontstaan.

#### *Kinidine:*

In combinatie met kinidine zijn na orale toediening van verapamil bij patiënten met hypertrofe obstructieve cardiomyopathie incidentele gevallen van hypotensie en longoedeem beschreven.

#### *Spierrelaxantia:*

Het effect van spierrelaxantia kan versterkt worden.

### **Houd rekening met:**

#### *Acetylsalicylzuur:*

Verapamil kan bij gelijktijdig gebruik van acetylsalicylzuur het remmend effect op de trombocytenaggregatie versterken.

#### *Dabigatran:*

Wanneer dabigatranetexilaat (150 mg), een P-gp substraat, gelijktijdig werd toegediend met oraal verapamil, waren de  $C_{max}$  en AUC van dabigatran verhoogd, maar de omvang van deze verandering verschilt afhankelijk van het moment van toediening en de formulering van verapamil. Toediening van verapamil 240 mg met verlengde afgifte op hetzelfde moment als dabigatran leidde tot verhoogde blootstelling aan dabigatran (verhoging van  $C_{max}$  met ongeveer 90% en van AUC met ongeveer 70%).

Nauwlettend klinisch toezicht wordt aanbevolen wanneer verapamil wordt gecombineerd met dabigatranetexilaat en in het bijzonder bij het optreden van bloedingen, met name bij patiënten met een lichte tot matig ernstige nierfunctiestoornis.

#### *Andere directe orale anticoagulantia (DOACs):*

De systemische biologische beschikbaarheid van DOACs, die substraten zijn voor Pgp en/of gemetaboliseerd worden door CYP3A4, zal naar verwachting toegenomen zijn wanneer gelijktijdig verapamil wordt toegediend. Data suggereren een mogelijk toegenomen risico op bloedingen, in het bijzonder bij patiënten met verdere risicofactoren. Het kan nodig zijn de dosering van de DOAC in combinatie met verapamil te verlagen (zie DOAC productinformatie voor doseerinstructies).

#### *Alcohol:*

Verapamil kan de ethanol plasmaspiegels verhogen.

#### *Metformine:*

Gelijktijdige toediening van verapamil met metformine kan de werkzaamheid van metformine verminderen.

#### **Farmacokinetische interacties met verapamil:**

Klinisch significante interacties zijn gerapporteerd met CYP3A4-remmers die een verhoging van de plasmaspiegels van verapamilhydrochloride veroorzaken terwijl CYP3A4-inductoren een verlaging van de plasmaspiegels van verapamilhydrochloride hebben veroorzaakt. Daarom dienen patiënten te worden gecontroleerd op geneesmiddelinteracties.

Verapamil kan de plasmaspiegel verhogen van andere middelen die een substraat zijn voor P-glycoproteïne en/of door het CYP1A, CYP2C, CYP3A en P-glycoproteïne worden gemetaboliseerd, zoals *almotriptan*, *bupiron*, *carbamazepine*, *ciclosporine*, *digoxine*, *doxorubicine*, *glibenclamide*, *imipramine*, *metoprolol*, *midazolam*, *prazosine*, *terazosine*, *propranolol*, *kinidine*, *everolimus*, *sirolimus*, *tacrolimus* en *theofylline*. Hierdoor is er een kans op toegenomen therapeutische effecten maar ook de kans op toxiciteit of bijwerkingen wordt verhoogd. Indien nodig kan dosisaanpassing of extra controle van de plasmaspiegels overwogen worden.

#### *HMG-CoA-reductaseremmers ('statines'):*

Er treedt een interactie op tussen verapamil en sommige HMG-CoA-reductaseremmers, namelijk die welke door CYP3A4 gemetaboliseerd worden. De behandeling van een patiënt die verapamil gebruikt met HMG-CoA-reductaseremmers (bijv. *atorvastatine*, *simvastatine*, *lovastatine*) moet gestart worden met de laagst mogelijke dosis. Vervolgens kan de dosis door middel van titratie verhoogd worden. Als verapamil wordt toegevoegd aan een bestaande behandeling met HMG-CoA-reductaseremmers (bijv. *atorvastatine*, *simvastatine* of *lovastatine*), dient men te overwegen de statine dosering te verlagen en opnieuw te titreren op geleide van de serumcholesterolspiegels. De AUC van verapamil wordt door atorvastatine met ongeveer 42,8% verhoogd. Vooral als verapamil en en simvastatine tegelijk in hoge doseringen worden gebruikt is de kans op bijwerkingen zoals myopathie en rhabdomyolyse verhoogd (zie rubriek 4.4).

*Fluvastatine*, *pravastatine* en *rosuvastatine* worden niet door het enzym CYP3A4 gemetaboliseerd, waardoor een interactie met verapamil onwaarschijnlijk is.

De plasmaconcentratie van verapamil kan worden verhoogd door remmers van het CYP3A4, zoals *cimetidine*, *erythromycine* en *andere macroliden* zoals *clarithromycine*, *ciclosporine*, *azolantimycotica* waaronder *itraconazol* en *nefazodon* en *telitromycine*. Sommige HIV antivirale middelen waaronder ritonavir kunnen de plasmaspiegel van verapamil verhogen als gevolg van de remmende werking op het metabolisme. Bij gelijktijdig gebruik dient men voorzichtig te zijn of de dosering verapamil te verlagen.

#### *Neuromusculair blokkerende middelen:*

Klinische gegevens en dierstudies suggereren dat het effect van neuromusculair blokkerende middelen (curare-achtigen en depolariserende) kan worden gepotentieerd door verapamilhydrochloride. Het kan nodig zijn de dosis verapamilhydrochloride en/of de dosis van het neuromusculair blokkerende middel te verlagen als ze gelijktijdig worden gebruikt.

#### *Ivabradine:*

Gelijktijdig gebruik met ivabradine is gecontra-indiceerd vanwege het additionele hartslag verlagende effect van verapamil op ivabradine (zie rubriek 4.3).

Het is aangetoond dat *grapefruitsap* de plasmaspiegel van verapamil kan verhogen. *Grapefruitsap* dient daarom niet samen met Verapamil HCl Sandoz retard ingenomen te worden.

De plasmaconcentratie van verapamil kan worden verlaagd door induceerders van het CYP3A4, zoals *rifampicine*, *fenytoïne*, *fenobarbital*, *St. Janskruid* en *sulfinpyrazon*.

#### *Colchicine:*

Verapamil verhoogt de AUC van colchicine (met ongeveer een factor 2) en de  $C_{max}$  (met ongeveer een factor 1,3). Verlaag de colchicine dosis.

## **4.6 Zwangerschap en borstvoeding**

### Zwangerschap

Over het gebruik van verapamil tijdens de zwangerschap bij de mens, met name tijdens het eerste trimester, bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn in dierproeven tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid gevonden. Bij gebruik aan het einde van de zwangerschap moet rekening worden gehouden met mogelijke weeënremming.

Gebruik van verapamil wordt met name in het eerste trimester ontraden, in het tweede en derde trimester moeten de voordelen voor de moeder worden afgewogen tegen de mogelijk nadelige effecten voor de ongeborene (op basis van de farmacologische werkzaamheid van verapamil zijn foetale bradycardie en hypotensie niet uit te sluiten).

### Borstvoeding

Verapamil gaat in geringe hoeveelheden over in de moedermelk. Het is echter niet waarschijnlijk dat bij therapeutische doseringen enig effect op de baby zal optreden. Nadelige effecten op het kind zijn tot nu toe nooit aangetoond. Het gebruik van verapamil lijkt daarom verenigbaar met het geven van borstvoeding.

## **4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen**

Vanwege het antihypertensieve effect kan verapamilhydrochloride, afhankelijk van de individuele respons, de rijvaardigheid, het vermogen om machines te bedienen of om te werken onder gevaarlijke omstandigheden beïnvloeden. Dit is vooral het geval aan het begin van de behandeling, als de dosis wordt verhoogd, wanneer wordt omgeschakeld van een ander geneesmiddel of in combinatie met alcohol. Verapamil kan de bloedspiegels van alcohol verhogen en de eliminatie vertragen. Daarom kunnen de effecten van alcohol versterkt zijn.

## 4.8 Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van Verapamil HCl Sandoz.

Bijwerkingen worden vermeld naar klasse van orgaansysteem en frequentie. De frequentie wordt gedefinieerd als: zeer vaak ( $\geq 1/10$ ), vaak ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), soms ( $\geq 1/1.000$ ,  $< 1/100$ ), zelden ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1.000$ ) en zeer zelden ( $< 1/10.000$ ), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

### **Bijwerkingen gerapporteerd uit klinische studies met verapamil en postmarketing farmacovigilantie activiteiten:**

Immuunsysteemaandoeningen  
Niet bekend: overgevoeligheid.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen  
Niet bekend: hyperkaliëmie.

Endocriene aandoeningen  
Zeer zelden: hyperprolactinemie.

Psychische stoornissen  
Soms: nervositeit.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen  
Soms: glucosetolerantie verlaagd.

Psychische stoornissen  
Vaak: zenuwachtigheid.

Zenuwstelselaandoeningen  
Vaak: hoofdpijn, duizeligheid  
Soms: tremor, paresthesie.  
Zelden: somnolentie  
Niet bekend: extrapiramidale stoornissen, paralyse (tetraparese)\*, convulsies.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen  
Soms: tinnitus.  
Niet bekend: vertigo.

Hartaandoeningen  
Vaak: sinusbradycardie, blokkering van de AV-geleiding (1e- graads), bradycardie.  
Soms: oedeem aan de enkels, hartinsufficiëntie, palpaties, tachycardie, sinus arrest.

Zeer zelden: sterke blokkering van de AV-geleiding (2e- of 3e-graads), welke in extreme gevallen tot asystolie kan leiden.

Niet bekend: hartfalen.

Bloedvataandoeningen

Vaak: blozen, hypotensie.

Soms: erytromelalgie.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Niet bekend: bronchospasme, dyspneu.

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: obstipatie.

Soms: misselijkheid, braken, buikpijn, ileus; gingiva (tandvlees) hyperplasie, maagdarmstoornissen.

Niet bekend: buikklasten.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden: hyperhidrose.

Zeer zelden: allergische verschijnselen van de huid (erytheem, jeuk, urticaria), Stevens-Johnson syndroom.

Niet bekend: angio-oedeem, erythema multiforme, maculopapulaire huiduitslag, alopecia, urticaria, purpura, pruritus, hyperhidrose.

Skeletspierstelsel- en bindweefsel-aandoeningen

Zeer zelden: spierpijn of gewrichtspijn.

Niet bekend: spierzwakte

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Zeer zelden: erectiele disfunctie, galactorroe, gynecomastie bij oudere patiënten, die met name voorkwam na langdurige behandeling.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: perifere oedeem

Soms: moeheid.

Onderzoeken

Zeer zelden: verhoging van leverenzymen, reversibele verhoging van de transaminase- en/of alkalische-fosfatasespiegel, waarschijnlijk ten gevolge van een allergische hepatitis.

Niet bekend: bloedprolactine verhoogd.

\* Er is een enkele post-marketing melding geweest van paralyse (tetraparese) geassocieerd met het gecombineerde gebruik van verapamil en colchicine. Dit kan veroorzaakt zijn doordat colchicine de bloed-hersen-barrière passeert ten gevolge van CYP3A4- en P-gp-remming door verapamil.

Gecombineerd gebruik van verapamil en colchicine wordt niet aanbevolen (zie rubriek 4.5).

#### **Melding van vermoedelijke bijwerkingen**

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl).

#### **4.9 Overdosering**



De belangrijkste symptomen na overdosering met verapamil kunnen worden herleid uit de farmacologische activiteit van de stof in het cardiovasculaire systeem. De symptomen omvatten hypotensie door myocardiale depressie en perifere vasodilatatie, negatieve inotropie, depressie van de prikkelvorming in de SA-knoop en cardiale geleidingsstoornissen leidende tot sinusbradycardie, 'sinus arrest', AV-blokkade, asystolie en acute respiratory distress-syndroom.

Na een overdosering van verapamil oraal dient de patiënt te worden geobserveerd en behandeld op een intensive-care-afdeling. De behandeling van de overdosering moet gericht zijn op het voorkomen van verdere absorptie van verapamil van het maagdarmkanaal uit, symptomatische behandeling van de genoemde toxische effecten en het compenseren van de calciumantagonerende effecten van deze stof. Na ingestie van tabletten met vertraagde afgifte dient totale darmlavage overwogen te worden.

Verdere absorptie van in het maagdarmkanaal aanwezige verapamil dient te worden voorkomen door maagspoeling, toediening van een adsorbens (geactiveerde koolstof) en een laxans (natriumsulfaat). Behalve algemene maatregelen voor het tegengaan van ernstige hypotensie (c.q. shock), te weten het in stand houden van een adequaat circulerend volume met plasma of plasmavervangingsmiddelen, kan ook inotrope ondersteuning met dopamine, dobutamine of isoprenaline worden gegeven. Atropine (of methylatropine) kan zinvol zijn bij de behandeling van de sinusbradycardie. Een AV-blokkade dient met sympathicomimetica (isoprenaline of orciprenaline) of een pacemaker te worden behandeld. Asystolie dient met de bekende maatregelen voor reanimatie te worden behandeld (cardiopulmonale resuscitatie, pacing, beta-adrenerge stimulering (bijv. isoproterenol hydrochloride) etc.). Het calciumantagonerende effect kan worden tegengegaan door parenterale toediening van calcium, bijvoorbeeld calciumgluconaat.

## 5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

### 5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische categorie: selectieve calciumkanaalantagonisten met direct effect op het hart, fenyalkylaminederivaten, ATC-code: C08DA01.

Verapamil HCl Sandoz retard behoort tot de groep der calciumantagonisten. Het farmacologische effect berust op een remming van de influx van calciumionen door de slow channels van de celmembraan van gladde spiercellen in de vaatwand en van de prikkelgeleidende en contractiele cellen in het hart.

Het werkingsmechanisme van verapamil leidt tot de volgende effecten:

1. Relaxatie en preventie van coronaire spasmen.  
Dit leidt tot verhoging van het zuurstofaanbod bij patiënten met coronaire spasmen en verklaart de effectiviteit bij de behandeling van vasospastische angina pectoris (Prinzmetal-angina of variant angina) en instabiele angina pectoris.
2. Arteriële vaatverwijding.  
Verapamil vermindert in het algemeen de arteriële druk tijdens rust en bij een gegeven inspanningsniveau door verwijding van de perifere arteriolen. Door de afname van de perifere weerstand (vermindering van de afterload) worden de zuurstofbehoefte en het energieverbruik van het myocard verminderd.
3. Anti-aritmisch effect.  
De elektrische activiteit van de sinusknoop en de atrioventriculaire knoop hangt in belangrijke mate af van de influx van calciumionen door de slow channels. Door het remmen van deze influx nemen de sinusfrequentie en de geleidingssnelheid in de atrioventriculaire knoop af. De refractaire periode van de atrioventriculaire knoop neemt toe. Het bovenstaande verklaart de

effectiviteit van verapamil bij supraventriculaire tachycardieën. De daling van de sinusfrequentie leidt tevens tot een vermindering van de zuurstofbehoefte van het myocard, hetgeen van belang is bij de behandeling van angina pectoris.

4. Vermindering van de contractiliteit van de hartspier.  
Het negatief inotrope effect van verapamil kan worden gecompenseerd door afname van de perifere weerstand. Het geïndexeerde hartminuutvolume neemt niet af, tenzij er al een verminderde linkerventrikelfunctie bestaat.

De sympathische regelbaarheid van het hart wordt niet door verapamil beïnvloed, omdat de bètareceptoren niet worden geblokkeerd. Dit betekent tevens dat spastische bronchitis en aanverwante aandoeningen niet tot de contra-indicaties van Verapamil HCl Sandoz retard behoren.

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat het geven van verapamil bij patiënten na een myocardinfarct die geen bètablokker kregen een verlaging geeft van de kans op reïnfarcering, zonder dat een significant effect op de overleving is aangetoond.

## 5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Verapamilhydrochloride is een racemisch mengsel bestaande uit gelijke delen van de R-enantiomeer en de S-enantiomeer. Beide enantiomeren zijn farmacologisch actief, waarbij de S-isomeer potenter is dan de R-isomeer. Verapamil wordt uitgebreid gemetaboliseerd. Norverapamil is een van de 12 metabolieten die in de urine is geïdentificeerd, heeft 10% tot 20% van de farmacologische activiteit van verapamil en is verantwoordelijk voor 6% van het uitgescheiden geneesmiddel. De steady state plasmaconcentraties van norverapamil en verapamil zijn gelijk. Steady state na meervoudige eenmaal daagse dosering wordt na drie of vier dagen bereikt.

### *Absorptie*

Na orale toediening wordt verapamil goed geabsorbeerd (ca. 90%) vanuit de dunne darm, de biologische beschikbaarheid is echter ongeveer 33% door het eerste passage metabolisme van verapamil. Na herhaalde toediening is de biologische beschikbaarheid ongeveer 2 keer hoger. De steady state concentraties van verapamil en de actieve metaboliet norverapamil zijn gelijk. Steady state wordt bereikt na 3-4 dagen, bij eenmaal daagse toediening van verapamil HCl.

De maximale plasmaspiegels worden gemiddeld 4-5 uur na toediening van verapamil HCl bereikt en de maximale plasmaspiegel van norverapamil wordt ongeveer 5 uur na inname bereikt. Gelijktijdige inname met voedsel heeft geen effect op de biologische beschikbaarheid van verapamil.

### *Distributie*

Verapamil wordt uitgebreid gedistribueerd naar de lichaamswefsels en heeft een verdelingsvolume van 1,8 – 6,8 l/kg bij gezonde vrijwilligers. De plasma-eiwitbinding bedraagt ongeveer 90%.

### *Biotransformatie*

Verapamil wordt uitgebreid gemetaboliseerd in de lever. *In vitro* studies hebben aangetoond dat verapamil wordt gemetaboliseerd door P450 CYP3A4, CYP1A2 CYP2C8, CYP2C9 en CYP2C18. In de urine zijn 12 metabolieten gevonden. Van deze metabolieten is alleen norverapamil merkbaar farmacologisch actief (ongeveer 20% van die van verapamil).

### *Eliminatie*

Na intraveneuze toediening wordt verapamil bi-exponentieel geëlimineerd. Na een snelle eerste distributiefase met een halfwaardetijd van ca. 4 minuten volgt een tragere eliminatiefase met een terminale eliminatietijd van 2-5 uur. Na orale toediening is de eliminatiehalfwaardetijd 3-7 uur. Ongeveer 50% van een toegediende dosis wordt binnen 24 uur door de nieren uitgescheiden en 70% binnen vijf

dagen. Ongeveer 3% tot 4% hiervan bestaat uit onveranderd verapamil en 6% uit norverapamil. 16% van de dosis wordt uitgescheiden in de feces.

### Bijzondere patiëntengroepen

#### *Pediatrische patiënten:*

Er is beperkte informatie beschikbaar over de farmacokinetiek bij kinderen. Na intraveneus doseren was de gemiddelde halfwaardetijd 9 uur en de gemiddelde klaring was 30 l/h bij kinderen van 7 tot 19 jaar oud (gemiddelde leeftijd: 12 jaar), terwijl dit ongeveer 70 l/h is voor volwassenen. Steady-state plasmaconcentraties blijken na oraal doseren bij kinderen iets lager te zijn dan bij volwassenen.

#### *Oudere patiënten:*

Bij ouderen kan de eliminatiehalfwaardetijd verlengd zijn, het antihypertensieve effect van verapamil wordt echter niet beïnvloed door leeftijd.

#### *Nierfunctiestoornis:*

Nierfunctiestoornis heeft geen effect op de farmacokinetiek van verapamil. Er werd geen verschil gezien tussen bij patiënten met eindstadium nierfalen en personen zonder nierfunctiestoornis. Verapamil en norverapamil worden niet significant verwijderd door hemodialyse.

#### *Leverfunctiestoornis:*

Bij patiënten met een leverfunctiestoornis zijn de maximale plasmaspiegels van verapamil verhoogd en is de halfwaardetijd verlengd, vanwege een lagere hepatische klaring (en daardoor ook een kleiner eerste passage effect) en een hoger distributievolume.

## **5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek**

Reproductiestudies zijn uitgevoerd bij konijnen en ratten met orale verapamil-doses tot 180 mg/m<sup>2</sup>/dag en 360 mg/m<sup>2</sup>/dag (vergeleken met een maximale aanbevolen dagelijkse orale dosis voor mensen van 300 mg/m<sup>2</sup>) en hebben geen aanwijzingen opgeleverd voor teratogeniciteit. Bij ratten resulteerde een dosis vergelijkbaar met de klinische dosis (360 mg/m<sup>2</sup>) echter in een toename in resorpties en vertraagde foetale groei en ontwikkeling. Deze effecten traden op in aanwezigheid van maternale toxiciteit (weerspiegeld door verminderde voedselconsumptie en lagere gewichtstoename van het vrouwtje). Het is ook aangetoond dat deze orale dosis hypotensie bij ratten veroorzaakt.

## **6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

### **6.1 Lijst van hulpstoffen**

Verapamil HCl Sandoz retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte bevatten tevens cellulose (E460), hydroxypropylmethylcellulose (E464), lactose, polyethyleenglycol 4000, magnesiumstearaat (E470b), natriumalgiinaat (E401), polyvinylpyrrolidon, siliciumdioxide (E551) en de kleurstoffen E172 en E171.

Verapamil HCl Sandoz retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte bevatten tevens cellulose (E460), hydroxypropylmethylcellulose (E464), lactose, polyethyleenglycol 4000, magnesiumstearaat (E572), natriumalgiinaat (E401), polyvinylpyrrolidon, siliciumdioxide (E551) en de kleurstoffen E104, E132 en E171.

### **6.2 Gevallen van onverenigbaarheid**

Niet van toepassing.

### **6.3 Houdbaarheid**

2 jaar.

### **6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Bewaren beneden 25°C.

### **6.5 Aard en inhoud van de verpakking**

Patiëntenverpakking à 30, 60 of 90 tabletten in PP/Aluminium strip.

### **6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies**

Zie rubriek 'Dosering en wijze van toediening'.

## **7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Sandoz B.V.  
Hospitaaldreef 29  
1315 RC Almere  
Nederland

## **8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

RVG 18016 Verapamil HCl Sandoz retard 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte  
RVG 19936 Verapamil HCl Sandoz retard 240 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

## **9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING**

Datum van eerste verlening van de vergunning: 4 april 1997  
Datum van laatste verlening: 4 april 2017

## **10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST**

Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 8 februari 2024