

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VAXIGRIP, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit.
Griepvaccin (gesplitst virion, geïnactiveerd).

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Griepvirus (geïnactiveerd, gesplitst) van de volgende stammen*:

- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - achtige stam (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)
..... 15 microgram HA**
- A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - achtige stam (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186)
..... 15 microgram HA**
- B/Colorado/06/2017 - achtige stam (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A)
..... 15 microgram HA**

Per dosis van 0,5 ml

- * Gekweekt in bevruchte kippeneieren van gezonde kippen
- ** Hemagglutinine

Dit vaccin voldoet aan de WHO-aanbevelingen (noordelijk halfrond) en het EU-besluit voor het seizoen 2018/2019.

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

VAXIGRIP kan sporen bevatten van eieren, zoals ovalbumine, en van neomycine, formaldehyde en octoxynol-9, die worden gebruikt in het productieproces (zie rubriek 4.3).

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie in voorgevulde spuit.

Na zacht schudden ziet het vaccin eruit als een witachtige, licht doorschijnende vloeistof.

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Preventie van griep.

VAXIGRIP is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 6 maanden.

Het gebruik van VAXIGRIP moet gebaseerd zijn op officiële aanbevelingen.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

Volwassenen: 0,5 ml.

Pediatrische patiënten

Kinderen vanaf 36 maanden: 0,5 ml.

Kinderen van 6 tot en met 35 maanden: 0,25 ml. Klinische gegevens zijn beperkt. Zie rubriek 6.6 voor meer informatie over toediening van de dosis van 0,25 ml.

Indien nationale aanbevelingen dat vereisen, kan een dosis van 0,5 ml worden gegeven.

Voor kinderen jonger dan 9 jaar die niet eerder zijn gevaccineerd, moet een tweede dosis worden toegediend na een tussenperiode van ten minste 4 weken.

Kinderen jonger dan 6 maanden: de veiligheid en werkzaamheid van VAXIGRIP is niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 6 maanden. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Wijze van toediening

De immunisering moet gebeuren via intramusculaire of diepe subcutane injectie.

Volwassenen en kinderen vanaf een leeftijd van 36 maanden: de voorkeurslocatie voor intramusculaire injectie is de musculus deltoideus.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 35 maanden: de voorkeurslocatie voor intramusculaire injectie is de anterolaterale zijde van de dij (of de musculus deltoideus in geval van voldoende spiermassa).

Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 maanden: de voorkeurslocatie voor intramusculaire injectie is de anterolaterale zijde van de dij.

Te nemen voorzorgen voorafgaand aan gebruik of toediening van het geneesmiddel

Voor instructies over de bereiding van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek 6.6.

4.3 Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen of voor een bestanddeel dat in sporenhoeveelheden aanwezig kan zijn, zoals eieren (ovalbumine, kippeneiwitten), neomycine, formaldehyde en octoxynol-9.

Vaccinatie dient in geval van matige of ernstige koorts of acute ziekte te worden uitgesteld.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Zoals voor alle inspuibare vaccins, moet er altijd een passende medische behandeling en controle voorhanden zijn, mocht zich na de toediening van het vaccin een anafylactische reactie voordoen. VAXIGRIP mag in geen geval intravasculair worden toegediend.

Net als bij andere intramusculair toe te dienen vaccins, is bij dit vaccin voorzichtigheid geboden bij toediening aan personen met trombocytopenie of een stollingsstoornis, aangezien er bij deze personen na intramusculaire toediening een bloeding zou kunnen ontstaan.

Syncope (flauwvallen) kan optreden na, of zelfs vóór, een vaccinatie als psychogene reactie op de naaldinjectie. Er dienen procedures aanwezig te zijn om letsel door flauwvallen te voorkomen en syncopereacties te beheren.

Zoals elk vaccin biedt VAXIGRIP mogelijk geen 100% bescherming voor gevoelige personen. De vorming van antilichamen bij patiënten met endogene of iatrogene immunosuppressie kan ontoereikend zijn.

Verstoring van serologisch onderzoek

Zie rubriek 4.5.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

VAXIGRIP mag samen met andere vaccins worden toegediend. De immunisatie moet op afzonderlijke ledematen worden uitgevoerd. Er moet worden opgemerkt dat bijwerkingen kunnen worden versterkt.

De immuunreactie kan verminderen als de patiënt een immunosuppressieve behandeling ondergaat. Na griepvaccinatie werden vals-positieve resultaten waargenomen bij serologische tests waarbij de ELISA-methode werd gebruikt om antistoffen op te sporen tegen HIV1, hepatitis C en vooral HTLV1. De Western Blot techniek weerlegt de vals-positieve ELISA-testresultaten. De voorbijgaande vals-positieve reacties zouden te wijten kunnen zijn aan de IgM-reactie door het vaccin.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Geïnactiveerde influenza vaccins kunnen toegediend worden in alle stadia van de zwangerschap. Er zijn meer veiligheidsgegevens beschikbaar voor het tweede en derde trimester van de zwangerschap dan voor het eerste trimester; doch gegevens uit het wereldwijd gebruik van geïnactiveerde influenza vaccins duiden niet op enige schadelijke gevolgen voor de foetus en de moeder te wijzen aan het vaccin.

Borstvoeding

VAXIGRIP mag worden gebruikt tijdens borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens over vruchtbaarheid beschikbaar.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

VAXIGRIP heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

4.8 Bijwerkingen

a. Samenvatting van het veiligheidsprofiel

Bij verrichte klinische onderzoeken hebben ongeveer 10.300 personen vanaf een leeftijd van 6 maanden VAXIGRIP gekregen.

Bij kinderen werden afhankelijk van hun immunisatieverleden en leeftijd verschillende doseringen en een verschillend aantal doses gebruikt (zie 'Pediatrische patiënten' in subparagraaf b, 'Lijst van bijwerkingen in tabelvorm').

De meeste bijwerkingen traden doorgaans op in de eerste 3 dagen na de injectie van VAXIGRIP en verdwenen doorgaans vanzelf binnen 3 dagen na het ontstaan ervan. De intensiteit van deze reacties was licht tot matig.

Pijn op de injectieplaats was bij alle populaties de meest gemelde reactie op de injectieplaats binnen 7 dagen na de injectie van VAXIGRIP.

De meest gemelde systemische reactie binnen 7 dagen na de injectie van VAXIGRIP was hoofdpijn bij volwassenen, ouderen en kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar, myalgie bij kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar, koorts bij kinderen in de leeftijd van 24 tot en met 35 maanden en prikkelbaarheid bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 23 maanden.

b. Lijst van bijwerkingen in tabelvorm

De onderstaande gegevens geven een overzicht van de frequentie van bijwerkingen die geregistreerd werden na vaccinatie met VAXIGRIP tijdens klinische onderzoeken en bij wereldwijde toepassing na het op de markt komen van VAXIGRIP.

De bijwerkingen zijn gerangschikt naar frequentie, op basis van de volgende frequentieaanduidingen:

Zeervaa ($\geq 1/10$);

Vaa ($\geq 1/100$, $< 1/10$);

Soms ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$);

Zelden ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$);

Zeervelden ($< 1/10.000$);

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Volwassenen en ouderen:

Het veiligheidsprofiel is gebaseerd op gegevens:

- uit klinische onderzoeken bij ruim 5000 volwassenen en 4400 ouderen van boven de 60 jaar,
- uit wereldwijde post-marketing ervaring in de gehele populatie (*).

| BIJWERKINGEN | FREQUENTIE |
|--|-------------------|
| <i>Bloed- en lymfestelselaandoeningen</i> | |
| Lymfadenopathie ⁽¹⁾ | Soms |
| Voorbijgaande trombocytopenie | Niet bekend* |
| <i>Immuunsysteemaandoeningen</i> | |
| Allergische reacties zoals overgevoeligheid voor geneesmiddelen ⁽²⁾ , atopische dermatitis ⁽²⁾ , urticaria ^(2,5) , orofaryngeale pijn, astma ⁽¹⁾ , allergische rhinitis ⁽²⁾ , rhinorrhea ⁽¹⁾ , allergische conjunctivitis ⁽²⁾ | Soms |
| Allergische reacties, zoals zwelling van het gezicht, pruritus ^(2,5) , erytheem, huiduitslag, overmatig blozen ⁽³⁾ , orale mucosa eruptie ⁽³⁾ , orale paresthesie ⁽³⁾ , irritatie van de keel, dyspneu ^(2,5) , niezen, verstopping van de neus ⁽²⁾ , congestie van de bovenste luchtwegen ⁽²⁾ , oculaire hyperemie ⁽²⁾ | Zelden |
| Allergische reacties, zoals erythemateuze uitslag, angio-oedeem, shock | Niet bekend* |
| <i>Zenuwstelselaandoeningen</i> | |
| Hoofdpijn | Zeer vaak |
| Duizeligheid ⁽⁷⁾ , somnolentie ⁽⁷⁾ | Soms |
| Hypo-esthesie ⁽²⁾ , paresthesie | Zelden |
| Neuralgie, convulsies, encefalomyelitis, neuritis en het Syndroom van Guillain-Barré | Niet bekend* |
| <i>Bloedvataandoeningen</i> | |
| Vasculitis, zoals purpura van Henoch-Schonlein, met in bepaalde gevallen voorbijgaande aantasting van de nieren | Niet bekend* |
| <i>Maagdarmstelselaandoeningen</i> | |
| Diarree, misselijkheid | Soms |
| Buikpijn ⁽²⁾ , braken | Zelden |
| <i>Huid- en onderhuidaandoeningen</i> | |
| Hyperhydrose ⁽¹⁾ | Soms |
| <i>Voedings- en stofwisselingsstoornissen</i> | |
| Verminderde eetlust | Zelden |
| <i>Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen</i> | |
| Myalgie | Zeer vaak |
| Artralgie ⁽¹⁾ | Soms |
| <i>Algemene aandoeningen en toedieningsplaatstoornissen</i> | |
| Pijn op de injectieplaats, malaise ⁽⁴⁾ | Zeer vaak |
| Koorts ⁽⁶⁾ , rillen, erytheem op de injectieplaats, induratie op de injectieplaats, zwelling/oedeem op de injectieplaats | Vaak |

| | |
|--|--------|
| Asthenie ⁽¹⁾ , vermoeidheid, ecchymose op de injectieplaats, pruritus op de injectieplaats, warm aanvoelende injectieplaats ⁽¹⁾ , ongemak op de injectieplaats | Soms |
| Griepachtige symptomen ⁽²⁾ , exfoliatie op de injectieplaats ⁽³⁾ , overgevoeligheid op de injectieplaats ⁽²⁾ | Zelden |

⁽¹⁾ Zelden gemeld bij ouderen

⁽³⁾ Gemeld tijdens klinische onderzoeken bij ouderen

⁽⁵⁾ Niet bekend bij ouderen

⁽⁷⁾ Zelden gemeld bij volwassenen

⁽²⁾ Gemeld tijdens klinische onderzoeken bij volwassenen

⁽⁴⁾ Vaak gemeld bij ouderen

⁽⁶⁾ Soms gemeld bij ouderen

Pediatrische patiënten

Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 8 jaar kregen afhankelijk van hun immunisatieverleden één of twee doses VAXIGRIP. Kinderen/adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar kregen één dosis.

Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 35 maanden kregen de formulering van 0,25 ml en kinderen vanaf een leeftijd van 3 jaar kregen de formulering van 0,5 ml.

- Kinderen/adolescenten in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar:

Het veiligheidsprofiel is gebaseerd op gegevens:

- uit klinische onderzoeken bij 363 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar en bij 296

kinderen/adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar,

- uit wereldwijde post-marketing ervaring in de gehele populatie (*).

Bij kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar bestonden de meest gemelde bijwerkingen binnen 7 dagen na de injectie van VAXIGRIP uit pijn op de injectieplaats (59,1%), erytheem/roodheid op de injectieplaats (30,3%), myalgie (25,0%), malaise (22,3%) en zwelling/oedeem op de injectieplaats (22,1%).

Bij kinderen/adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar bestonden de meest gemelde bijwerkingen binnen 7 dagen na de injectie van VAXIGRIP uit pijn op de injectieplaats (65,3%), hoofdpijn (28,6%) en myalgie (27,6%).

| BIJWERKINGEN | FREQUENTIE |
|--|--------------|
| <i>Bloed- en lymfestelselaandoeningen</i> | |
| Lymfadenopathie ^(1,6) | Soms |
| Voorbijgaande trombocytopenie | Niet bekend* |
| <i>Immuunsysteemaandoeningen</i> | |
| Allergische reacties zoals urticaria, huiduitslag, pruritus ^(1,6) , orofaryngeale pijn ⁽¹⁾ | Soms |
| Allergische reacties, zoals erythemateuze huiduitslag, dyspneu, angio-oedeem, shock | Niet bekend* |
| <i>Zenuwstelselaandoeningen</i> | |
| Hoofdpijn | Zeer vaak |
| Duizeligheid ⁽²⁾ | Soms |
| Neuralgie, paresthesie, convulsies, encefalomyelitis, neuritis en het Syndroom van Guillain-Barré | Niet bekend* |
| <i>Bloedvataandoeningen</i> | |

| | |
|--|--------------|
| Vasculitis, zoals purpura van Henoch-Schonlein, met in bepaalde gevallen voorbijgaande aantasting van de nieren | Niet bekend* |
| Maagdarmstelselaandoeningen | |
| Diarree ⁽¹⁾ , buikpijn ⁽¹⁾ | Soms |
| Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen | |
| Myalgie | Zeer vaak |
| Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen | |
| Pijn op de injectieplaats, erytheem op de injectieplaats, zwelling/oedeem op de injectieplaats, induratie op de injectieplaats ⁽³⁾ , malaise, rillen ⁽⁴⁾ | Zeer vaak |
| Koorts, ecchymose op de injectieplaats ⁽⁵⁾ | Vaak |
| Pruritus op de injectieplaats, warm aanvoelende injectieplaats ⁽²⁾ , ongemak op de injectieplaats ⁽²⁾ , huilen ⁽¹⁾ , asthenie ⁽²⁾ , vermoeidheid | Soms |

⁽¹⁾ Gemeld tijdens klinische onderzoeken bij kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar

⁽²⁾ Gemeld tijdens klinische onderzoeken bij kinderen/adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar

⁽³⁾ Vaak voorkomend bij kinderen/adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar

⁽⁴⁾ Vaak voorkomend bij kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar

⁽⁵⁾ Soms voorkomend bij kinderen/adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar

⁽⁶⁾ Niet bekend bij kinderen/adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar

Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 35 maanden:

Het veiligheidsprofiel is gebaseerd op gegevens:

- uit klinische onderzoeken bij 101 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 35 maanden,
- - uit wereldwijde post-marketing ervaring in de algehele populatie (*).

De meest gemelde bijwerkingen binnen 7 dagen na de injectie van VAXIGRIP bestonden uit prikkelbaarheid (50,9%), gevoeligheid op de injectieplaats (36,6%), erytheem op de injectieplaats (34,0%), abnormaal huilen (34,0%), koorts (29,0%) en verlies van eetlust (28,3%).

| BIJWERKINGEN | FREQUENTIE |
|--|--------------|
| Bloed- en lymfestelselaandoeningen | |
| Voorbijgaande trombocytopenie, lymfadenopathie | Niet bekend* |
| Immuunsysteemaandoeningen | |
| Allergische reacties, zoals pruritus, erythemateuze huiduitslag, urticaria, dyspneu, angio-oedeem, shock | Niet bekend* |
| Voedings- en stofwisselingsstoornissen | |
| Verlies van eetlust ⁽¹⁾ | Zeer vaak |
| Psychische stoornissen | |
| Abnormaal huilen ⁽¹⁾ , prikkelbaarheid ⁽¹⁾ | Zeer vaak |
| Zenuwstelselaandoeningen | |
| Hoofdpijn ⁽²⁾ , sufheid ⁽¹⁾ | Zeer vaak |
| Paresthesie, convulsies, encefalomyelitis | Niet bekend* |
| Bloedvataandoeningen | |

| | |
|--|--------------|
| Vasculitis, zoals purpura van Henoch-Schonlein, met in bepaalde gevallen voorbijgaande aantasting van de nieren | Niet bekend* |
| Maagdarmstelselaandoeningen | |
| Diarree, braken ⁽¹⁾ | Vaak |
| Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen | |
| Myalgie ⁽²⁾ | Zeer vaak |
| Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen | |
| Gevoeligheid op de injectieplaats, erytheem op de injectieplaats, induratie op de injectieplaats, ecchymose op de injectieplaats, zwelling/oedeem op de injectieplaats, koorts | Zeer vaak |
| Rillen ⁽²⁾ | Vaak |

⁽¹⁾ Gemeld bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 23 maanden

⁽²⁾ Gemeld bij kinderen in de leeftijd van 24 tot en met 35 maanden

c. Andere bijzondere populaties

Hoewel er maar een beperkt aantal patiënten met comorbiditeiten deelnam, werden bij onderzoeken onder patiënten die een niertransplantatie hadden ondergaan, patiënten met astma, of kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 3 jaar met een medische aandoening die een extra grote kans hadden om ernstige aan griep gerelateerde complicaties te krijgen, voor deze populaties geen grote verschillen gevonden voor wat betreft het veiligheidsprofiel van VAXIGRIP.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.

4.9 Overdosering

Voor VAXIGRIP zijn gevallen van toediening van meer dan de aanbevolen dosis (overdosering) gemeld. Wanneer er bijwerkingen gemeld werden, was de informatie in lijn met het bekende, in rubriek 4.8 beschreven veiligheidsprofiel van VAXIGRIP.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische groep: INFLUENZA VACCIN, ATC-code: J07BB02

Doorgaans wordt binnen 2 tot 3 weken een antilichaam-/immuunrespons opgewekt. De duur van de na de vaccinatie opgewekte immuniteit varieert, maar bedraagt doorgaans 6 tot 12 maanden.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

Niet van toepassing.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek

Niet van toepassing.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Bufferoplossing:

- Natriumchloride
- Kaliumchloride
- Dinatriumfosfaat dihydraat
- Kaliumdiwaterstoffosfaat
- Water voor injectie

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen worden gemengd.

6.3 Houdbaarheid

1 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren. De spuit in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

0,5 ml suspensie in een voorgevulde spuit (type I glas) met naald en met een plunjerstopper (elastomeer chloorbroombutyl of chloorbutyl of broombutyl). Doos van 1, 10, 20 of 50.

0,5 ml suspensie in een voorgevulde spuit (type I glas) zonder naald en met een plunjerstopper (elastomeer chloorbroombutyl of chloorbutyl of broombutyl). Doos van 1, 10, 20 of 50.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies

Het vaccin moet bij voorkeur op kamertemperatuur komen vóór gebruik.

Schudden vóór gebruik. Visueel controleren voor toediening.

Het vaccin dient niet te worden gebruikt als er vreemde deeltjes in de suspensie aanwezig zijn.

Instructies voor toediening van 0,25 ml bij kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 35 maanden

Wanneer gebruik van een dosis van 0,25 ml wordt aanbevolen, dient eerst de helft van het in de spuit van 0,5 ml aanwezige volume uit de spuit te worden verwijderd. Dit dient gedaan te worden door de spuit rechtop te houden en vervolgens op de plunjerstopper te duwen totdat deze het op de spuit weergegeven dunne zwarte lijntje bereikt. Het resterende volume van 0,25 ml wordt ingespoten. Zie ook rubriek 4.2.

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Sanofi Pasteur Europe
14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon
Frankrijk

8. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

"

Kj gvtgi kvgt'kpi gvej txxgp'qpf gt'TXI '445280'

"

"

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

"

F cwo 'xcp'ggvug'xgtngpkpi 'xcp'f g'xgti wppkpi <42'cr tkd'3; ; : "

F cwo 'xcp'xcvug'j gtpkwy kpi <52'f gego dgt'4229"

"

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

"

Nccvug'i gf ggngndng'y kl ki kpi 'dgtghv'f g'twdtkgn'4<5'cwi wuwu'423:

"

"

"