

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

1. BENAMING

Infludo[®]; druppels voor oraal gebruik, oplossing

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Infludo[®] bevat per 100 g:

Aconitum napellus, planta tota D3	10 g
Bryonia cretica, radix D2	6 g
Eucalyptus globulus, folium D2	5 g
Eupatorium perfoliatum, herba D2	4 g
Phosphorus D4	10 g
Sabadilla, semen D3	10 g

Alcoholgehalte ca. 65% (v/v)

Voor de volledige hulpstoffenlijst wordt verwezen naar rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Druppels voor oraal gebruik, oplossing.

4. GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING

4.1 Indicatie

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

4.2 Dosering en wijze van toediening

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tot 4 maal daags 5-8 druppels.

In acute gevallen om de 2 uur 5-8 druppels (maximaal 12 maal per dag).

De druppels bij voorkeur een half uur voor de maaltijd in wat water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Als binnen 14 dagen geen effect wordt bemerkt of wanneer de klachten verergeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Infludo[®].

4.4 Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Dit geneesmiddel bevat 65% (v/v) ethanol (alcohol), d.w.z. max. 152 mg per dosis, hetgeen overeenkomt met 3,85 ml bier of 1,60 ml wijn per dosis. Schadelijk bij alcoholisme.

Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en bij groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

4.6 Zwangerschap en lactatie

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Infludo[®] bij zwangere vrouwen. Dieronderzoek heeft onvoldoende gegevens opgeleverd wat betreft reproductietoxiciteit. Tevens is niet bekend of inhoudsstoffen van Infludo[®] of hun metabolieten in de moedermelk worden uitgescheiden. Daarom wordt het gebruik van Infludo[®] tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding afgeraden.

4.7 Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt Infludo® bij de aanbevolen dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

4.8 Bijwerkingen

Er zijn van Infludo® geen bijwerkingen bekend.

4.9 Overdosering

Symptomen van overdosering zijn niet bekend.

5. EIGENSCHAPPEN

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Alcohol

Water

6.2 Onverenigbaarheden

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 6 maanden.

6.4 Speciale voorzorgen voor bewaring

Niet bewaren boven 25°C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Het product is verpakt in een 50 ml bruinglazen flacon, afgesloten met een LDPE druppelaar en verzegeld met een witte HDPE schroefdop, in een doosje met een bijsluiters.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Weleda Benelux SE

Platinastraat 161

2718 SR Zoetermeer

Tel: 079 3631313

Fax: 079 3631303

Email: info@weleda.nl

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVH 84701

9. DATUM VAN GOEDKEURING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 11/08/2004

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE SAMENVATTING

November 2016: toevoeging houdbaarheid na openen