

SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

1. BENAMING

Weleda Kinfludo, globuli

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

10 g Weleda Kinfludo, globuli bevat impregnatie van:

Aconitum napellus, planta tota D1	0,01 g
Bryonia cretica, radix D1	0,06 g
Eucalyptus globulus, folium Ø=D1	0,05 g
Eupatorium perfoliatum, herba D1	0,04 g
Ferrum phosphoricum D6	0,10 g
Sabadilla, semen Ø=D1	0,01 g

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Globuli

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Therapeutische indicaties

Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: om de 1 à 2 uur 15 korreltjes

Kinderen van 6 tot 11 jaar: om de 1 à 2 uur 8 tot 10 korreltjes

Kinderen van 1 tot 5 jaar: 3 tot 4 maal daags 8 tot 10 korreltjes

Kinderen jonger dan 1 jaar: 3 tot 4 maal daags 3 tot 5 korreltjes

Wijze van toediening

De korreltjes in de mond laten oplossen. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen de korreltjes eventueel opgelost in wat thee of lauw water (i.v.m. verslikken) innemen.

Als binnen 3 dagen geen effect wordt bemerkt of wanneer de klachten verergeren dient een arts te worden geraadpleegd.

4.3 Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Weleda Kinfludo.

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Indien u koorts heeft die langer dan 3 dagen aanhoudt, de koorts boven 39°C komt, u ademhalingsmoeilijkheden heeft, de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden of er nieuwe symptomen optreden, dient een arts of apotheker geraadpleegd te worden.

Patiënten met de zeldzaam erfelijke aandoeningen als fructose- of galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie, glucose-galactose malabsorptie of sucrase-isomaltase insufficiëntie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van deze Weleda Kinfludo in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tevens is niet bekend of inhoudsstoffen van Weleda Kinfludo of hun metabolieten een effect hebben op de vruchtbaarheid en in de moedermelk worden uitgescheiden. Uit voorzorg wordt geadviseerd om Weleda Kinfludo niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Weleda Kinfludo heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

4.8 Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

De frequentie wordt als volgt uitgedrukt:

- zeer vaak: 1/10;
- vaak: 1/100 tot < 1/10;
- soms: 1/1000 tot < 1/100;
- zelden: 1/10000 tot < 1/1000;
- zeer zelden: < 1/10000;
- niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Systeem/orgaan klasse	Frequentie	Bijwerking
Immuunsysteemaandoeningen	niet bekend	Overgevoeligheidsreacties van de huid; jeuk, uitslag en eczeem

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via www.lareb.nl.

4.9 Overdosering

In het algemeen zijn er geen bijwerkingen te verwachten na inname van een dubbele dosis.

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Homeopatisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties, toegepast volgens de principes van de antroposofische geneeskunde.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen

Sucrose, lactose

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid

Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid

In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.

Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 1 maand.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

Het product is per 10 g verpakt in een bruinglazen rond flesje met een doseersluiting van LDPE en verzegeld met een witte HDPE schroefdop in een doosje met een bijsluiter.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geen bijzondere vereisten voor verwijdering.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Weleda Benelux SE

Platinastraat 161

2718 SR Zoetermeer

Tel: 079 3631313

Fax: 079 3631303

Email: info@weleda.nl

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

RVH 84705

9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING

15 december 2015

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

27 juni 2017 update houdbaarheid na eerste opening