

**BIJLAGE I**  
**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN**

## 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PULVEX SPOT 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden

## 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Per ml:

### Werkzaam bestanddeel:

Permethrin 715 mg

### Hulpstof:

1-methoxypropaan-2-ol tot 1 ml

Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

## 3. FARMACEUTISCHE VORM

Spot-on oplossing

Heldere, donkergele oplossing

## 4. KLINISCHE GEGEVENS

### 4.1 Doeldiersoort(en)

Hond

### 4.2 Indicatie(s) voor gebruik met specificatie van de doeldiersoort(en)

Bestrijding en preventie van vlooiëinfestaties (*Ctenocephalides felis* en *Ctenocephalides canis*).

Bestrijding en preventie van tekeninfestaties (*Ixodes ricinus* en *Rhipicephalus sanguineus*).

Het diergeneesmiddel kan opgenomen worden in een behandelingschema voor vlooiëallergiedermatitis (VAD).

Een enkelvoudige toediening doodt vlooiën en teken en beschermt tegen herinfestatie door vlooiën en teken gedurende twee tot vier weken na behandeling.

### 4.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken bij pups jonger dan 2 weken.

Niet gebruiken bij katten.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

### 4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Het vasthechten van een enkele teek kan niet uitgesloten worden.

#### **4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik**

##### Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Permethrin is extreem giftig voor katten. Ter voorkoming dat katten per ongeluk in contact komen met het diergeneesmiddel moeten katten weggehouden worden van behandelde honden totdat de behandelde plek droog is. Zorg ervoor dat katten de toedieningsplaats van een behandelde hond niet likken. Raadpleeg onmiddellijk een dierenarts wanneer dit toch gebeurt.

Omdat permethrin giftig is voor waterorganismen, mag een behandelde hond niet in contact komen met oppervlaktewater gedurende tenminste 24 uur na behandeling.

##### Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd contact met de huid. Was de handen na toediening.

Vermijd contact met de ogen. Spoel met overvloedig water als het diergeneesmiddel in aanraking met de ogen is gekomen.

Onmiddellijk afwassen met water en zeep na morsen op de huid.

Raak de behandelde plaats niet aan gedurende 3-6 uur na behandeling. Het wordt daarom aanbevolen de dieren 's avonds te behandelen. Recent behandelde dieren mogen niet slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar; dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Personen die het diergeneesmiddel frequent toedienen, bijvoorbeeld fokkers of personeel in kennels, dienen neopreen of nitril handschoenen te dragen, met een minimumdikte van 3 mm.

#### **4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)**

In zeldzame gevallen zijn reacties op de plaats van toediening en/of overgevoeligheidsreacties van de huid (dat wil zeggen roodheid, jeuk en haarverlies) gemeld. Gangbare symptomen kunnen verlies van eetlust, braken, vermoeidheid, excitatie, tremoren, convulsies en/of ataxie zijn. De effecten verdwijnen vaak binnen een paar uren indien de hond gewassen wordt met water en shampoo. Raadpleeg in ernstige gevallen een dierenarts.

#### **4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg**

Teratologische studies bij laboratoriumdieren geven aan dat zowel permethrin als 1-methoxypropaan-2-ol geen teratogene risico's heeft. Het gebruik van het diergeneesmiddel tijdens dracht of lactatie is niet onderzocht bij de hond.

Indien nodig dienen drachtige teven enige tijd voor het werpen behandeld te worden, om blootstelling van pasgeboren pups aan het diergeneesmiddel tot een minimum te beperken.

#### **4.8 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie**

Niet gelijktijdig gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroiden, organofosforverbindingen of carbamaten.

## 4.9 Dosering en toedieningsweg

### Doseringsschema:

- Honden van minder dan 15 kg: 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen.
- Honden tussen 15 kg en 30 kg: 2 ml, i.e. 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen en 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart.
- Honden van 30 kg en meer: 3 ml, i.e. 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart en 1 ml (1 pipet) in het midden van de ruglijn.

Gewicht van de hond (kg)	Volume diergeneesmiddel	Plaats van toediening	Permethrin (mg/kg lichaamsgewicht)
< 15 kg	1 ml	1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen	Tussen 286 mg/kg lichaamsgewicht en 47,6 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 2,5 tot 15 kg
15 – 30 kg	2 ml	1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen en 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart	Tussen 95,3 mg/kg lichaamsgewicht en 47,6 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 15 tot 30 kg
≥ 30 kg	3 ml	1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart en 1 ml (1 pipet) in het midden van de ruglijn	Beginnend met 71,5 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 30 kg en afnemend naarmate het gewicht toeneemt

### Wijze van toediening:

Voor spot-on gebruik

Open een sachet en verwijder de pipet uit het sachet.



**Stap 1:** De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.



**Stap 2:** Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen.



**Stap 3** (kleine honden): Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.



**Stap 3** (grotere honden): De gehele inhoud van de pipetten dient gelijkmatig te worden toegediend op twee verschillende plekken langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.

Breng het diergeneesmiddel direct op de huid aan. Alleen aanbrengen op intacte huid.

Aanhoudend, intensief contact met water moet vermeden worden. In geval van frequent watercontact kan de bescherming verminderen. In deze gevallen kan de behandeling op zijn vroegst 7 dagen na de voorgaande behandeling worden herhaald.

#### **4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk**

Honden behandeld met vier keer de aanbevolen dosis vertoonden geen bijwerkingen.

#### **4.11 Wachtijd(en)**

Niet van toepassing.

### **5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN**

Farmacotherapeutische groep: ectoparasitiden (voor topicaal gebruik)

ATCvet-code: QP53AC04

#### **5.1 Farmacodynamische eigenschappen**

Het actieve bestanddeel permethrin (cis:trans 40:60) is een insecticide, synthetisch pyrethroïde dat bij insecten selectief de overdracht van de zenuwimpuls onderbreekt. Permethrin oefent zijn activiteit uit door in het insect een verandering te veroorzaken in de permeabiliteit van de zenuwmembraan voor natrium en kalium.

#### **5.2 Farmacokinetische eigenschappen**

Permethrin wordt door mens en dier snel gemetaboliseerd, maar voor ectoparasitaire arthropoden zoals vlooien en teken heeft het een krachtiger toxiciteit, omdat bij ectoparasieten zowel het metabolisme als de eliminatie van permethrin veel trager verloopt.

## **6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS**

### **6.1 Lijst van hulpstoffen**

1-Methoxypropaan-2-ol

### **6.2 Belangrijke onverenigbaarheden**

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

### **6.3 Houdbaarheidstermijn**

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 4 jaar.

### **6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren**

Bewaren beneden 25 °C.

Beschermen tegen bevriezing.

Beschermen tegen licht.

### **6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking**

Kartonnen doos met spot-on applicatoren bestaande uit pipetten à 1 ml. De pipet bestaat uit een blister film (polypropyleen/cyclisch-olefin-copolymeer/polypropyleen) en een lidstock folie (aluminium/polypropyleen gecoe-extrudeerd) verpakt in kindveilige aluminium sachets.

6 x 1 ml

### **6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of afvalmateriaal voortkomend uit het gebruik van het diergeneesmiddel**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Diergeneesmiddelen die permethrin bevatten zijn toxisch voor bijen.

## **7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet Nederland B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nederland

### Correspondentieadres:

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer  
Nederland

**8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

REG NL 9251

**9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING / VERLENGING VAN DE VERGUNNING**

Datum van eerste vergunningverlening: 3 november 2000

Datum van laatste verlenging: 3 november 2010

**10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST**

04 juni 2021

**KANALISATIE**

VRIJ

**BIJLAGE II**  
**ETIKETTERING EN BIJSLUITER**



## **A. ETIKETTERING**

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

**Kartonnen doos**

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Pulvex Spot 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

Per ml:

**Werkzaam bestanddeel:**

Permethrin 715 mg

**Hulpstof:**

1-methoxypropan-2-ol tot 1 ml

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Spot-on oplossing

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

6 pipetten

**5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond



**6. INDICATIE(S)**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Voor spot-on gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

## 8. WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

## 9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

### Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Permethrin is extreem giftig voor katten. Ter voorkoming dat katten per ongeluk in contact komen met het diergeneesmiddel, moeten katten weggehouden worden van behandelde honden totdat de behandelde plek droog is. Zorg ervoor dat katten de toedieningsplaats van een behandelde hond niet likken. Raadpleeg onmiddellijk een dierenarts wanneer dit toch gebeurt.

Omdat permethrin giftig is voor waterorganismen mag een behandelde hond niet in contact komen met oppervlaktewater gedurende tenminste 24 uur na behandeling.

### Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Vermijd contact met de huid. Was de handen na toediening.

Vermijd contact met de ogen. Spoel met overvloedig water als het diergeneesmiddel in aanraking met de ogen is gekomen.

Onmiddellijk afwassen met water en zeep na morsen op de huid.

Raak de behandelde plaats niet aan gedurende 3-6 uur na behandeling. Het wordt daarom aanbevolen de dieren 's avonds te behandelen. Recent behandelde dieren mogen niet slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar; dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Personen die het diergeneesmiddel frequent toedienen, bijvoorbeeld fokkers of personeel in kennels, dienen neopreen of nitril handschoenen te dragen, met een minimumdikte van 3 mm.

## 10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

## 11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C.

Beschermen tegen bevriezing.

Beschermen tegen licht.

## 12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Diergeneesmiddelen die permethrin bevatten zijn toxisch voor bijen.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN  
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET  
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
VRIJ

**14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE  
HANDEL BRENGEN**

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer  
Nederland

**16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

REG NL 9251

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Batch/Lot

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**

**Sachet**

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Pulvex Spot 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden  
Permethrin

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

715 mg/ml

**3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN**

1 ml

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Spot-on gebruik.

**5. WACHTTIJD(EN)**

Niet van toepassing.

**6. PARTIJNUMMER**

Batch/Lot

**7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP {maand/jaar}

**8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
REG NL 9251 VRIJ

**9. OVERIG**



**MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD**

**Etiket pipet**

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Pulvex Spot 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden  
Permethrin

**2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet Nederland B.V.

**3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP {maand/jaar}

**4. PARTIJNUMMER**

Batch/Lot

**5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**6. OVERIG**



**B. BIJSLUITER**

(De bijsluitertekst wordt gedrukt op de kartonnen doos met gevouwen kartonnen voorkant)

**BIJSLUITER**  
**Pulvex Spot 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden**

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer  
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet Productions s.r.l.  
Via Nettunense Km 20,300  
04011 Aprilia (LT)  
Italië

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Pulvex Spot 715 mg/ml spot-on oplossing voor honden

**3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)**

Per ml:

**Werkzaam bestanddeel:**

Permethrin 715 mg

**Hulpstof:**

1-Methoxypropaan-2-ol tot 1 ml

**4. INDICATIE(S)**

Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (*Ctenocephalides felis* en *Ctenocephalides canis*).  
Bestrijding en preventie van tekeninfestaties (*Ixodes ricinus* en *Rhipicephalus sanguineus*).  
Het diergeneesmiddel kan opgenomen worden in een behandelingsschema voor vlooienallergiedermatitis (VAD).

Een enkelvoudige toediening doodt vlooien en teken en beschermt tegen herinfestatie door vlooien en teken gedurende twee tot vier weken na behandeling.

**5. CONTRA-INDICATIES**

Niet gebruiken bij pups jonger dan 2 weken.

Niet gebruiken bij katten.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.



**6. BIJWERKINGEN**

In zeldzame gevallen zijn reacties op de plaats van toediening en/of overgevoeligheidsreacties van de huid (dat wil zeggen roodheid, jeuk en haarverlies) gemeld. Gangbare symptomen kunnen verlies van eetlust, braken, vermoeidheid, excitatie, tremoren, convulsies en/of ataxie zijn. De effecten verdwijnen vaak binnen een paar uren indien de hond gewassen wordt met water en shampoo. Raadpleeg in ernstige gevallen een dierenarts.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**7. DOELDIERSOORT(EN)**

Hond

**8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK**

<b>Gewicht van de hond (kg)</b>	<b>Volume diergeneesmiddel</b>	<b>Plaats van toediening</b>	<b>Permethrin (mg/kg lichaamsgewicht)</b>
< 15 kg	1 ml	1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen	Tussen 286 mg/kg lichaamsgewicht en 47,6 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 2,5 tot 15 kg
15 – 30 kg	2 ml	1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen en 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart.	Tussen 95,3 mg/kg lichaamsgewicht en 47,6 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 15 tot 30 kg
≥ 30 kg	3 ml	1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart en 1 ml (1 pipet) in het midden van de ruglijn.	Beginnend met 71,5 mg/kg lichaamsgewicht bij honden van 30 kg en afnemend naarmate het gewicht toeneemt.


## 9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

- Honden van minder dan 15 kg: 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen.
- Honden tussen 15 kg en 30 kg: 2 ml, i.e. 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen en 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart.
- Honden van 30 kg en meer: 3 ml, i.e. 1 ml (1 pipet) tussen de schouderbladen, 1 ml (1 pipet) aan de basis van de staart en 1 ml (1 pipet) in het midden van de ruglijn.

### Wijze van toediening:

Voor spot-on gebruik

Open een sachet en verwijder de pipet uit het sachet.



**Stap 1:** De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.

**Stap 2:** Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen.



**Stap 3 (kleine honden):** Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.



**Stap 3 (grotere honden):** De gehele inhoud van de pipetten dient gelijkmatig te worden toegediend op twee verschillende plekken langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.

Breng het diergeneesmiddel direct op de huid aan. Alleen aanbrengen op intacte huid.

Aanhoudend, intensief contact met water moet vermeden worden. In geval van frequent watercontact kan de bescherming verminderen. In deze gevallen kan de behandeling op zijn vroegst 7 dagen na de voorgaande behandeling worden herhaald.

## 10. WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

## **11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren beneden 25 °C.

Beschermen tegen bevrozing.

Beschermen tegen licht.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)**

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Het vasthechten van een enkele teek kan niet uitgesloten worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Permethrin is extreem giftig voor katten. Ter voorkoming dat katten per ongeluk in contact komen met het diergeneesmiddel, moeten katten weggehouden worden van behandelde honden totdat de behandelde plek droog is. Zorg ervoor dat katten de toedieningsplaats van een behandelde hond niet likken. Raadpleeg onmiddellijk een dierenarts wanneer dit toch gebeurt.

Omdat permethrin giftig is voor waterorganismen mag een behandelde hond niet in contact komen met oppervlaktewater gedurende ten minste 24 uur na behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Vermijd contact met de huid. Was de handen na toediening.

Vermijd contact met de ogen. Spoel met overvloedig water als het diergeneesmiddel in aanraking met de ogen is gekomen.

Onmiddellijk afwassen met water en zeep na morsen op de huid.

Raak de behandelde plaats niet aan gedurende 3-6 uur na behandeling. Het wordt daarom aanbevolen de dieren 's avonds te behandelen. Recent behandelde dieren mogen niet slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar; dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Personen die het diergeneesmiddel frequent toedienen, bijvoorbeeld fokkers of personeel in kennels, dienen neopreen of nitril handschoenen te dragen, met een minimumdikte van 3 mm.

Dracht en lactatie:

Teratologische studies bij laboratoriumdieren geven aan dat zowel permethrin als 1-methoxypropaan-2-ol geen teratogene risico's heeft. Het gebruik van het diergeneesmiddel tijdens dracht of lactatie is niet onderzocht bij de hond.

Indien nodig dienen drachtige teven enige tijd voor het werpen behandeld te worden, om blootstelling van pasgeboren pups aan het diergeneesmiddel tot een minimum te beperken.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Niet gelijktijdig gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroiden, organofosforverbindingen of carbamaten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Honden behandeld met vier keer de aanbevolen dosis vertoonden geen bijwerkingen.

Onverenigbaarheden:

Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel.

**13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-  
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het diergeneesmiddel dient niet in het oppervlaktewater terecht te komen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn voor vissen en andere waterorganismen.

Diergeneesmiddelen die permethrin bevatten zijn toxisch voor bijen.

**14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

13 december 2022

**15. OVERIGE INFORMATIE**

Voor alle informatie over dit diergeneesmiddel kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

REG NL 9251

VRIJ

